

Forêt de Sainte Apolline, 1 ^{er} novembre 2009, 95 espèces			Commune : Plaisir		MEN : 2214C
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA					
Sous-classe Pyrenomycetideae					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
Sous-classe Pezizomycetideae					
9,2	<i>Rutstroemia firma</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pézize ferme		chêne	
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée			
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
Classe : Homobasidiomycètes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
80,4	<i>Phellinus nigricans</i> (Fr. : Fr.) Karsten	Polypore noirissant		bouleau	
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf		chêne	
86	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers.:Fr.) Karsten	Polypore rutilant			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.)	Lenzite tricolore			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée			
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>tuberaster</i>		
118	<i>Macrotyphula filiformis</i> (Bull. : Fr.) Paechnatz	Clavaire filiforme	<i>juncea</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
280	<i>Clitocybe squamulosa</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Clitocybe squamuleux			Chapeau ocre rosé feutré, pied strié concolore, KOH brun
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué			Spores subsphériques de 9 µm
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
390	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun		bouleau	
433	<i>Ripartites metrodii</i> Huijsman	Ripartite de Métrod			
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé			
494,5	<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar	Marasme des feuilles de chênes	<i>Selutipes q.</i>	chêne	
506	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau		chêne	
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes		chêne	
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus, marasmioides</i>		Nombreux
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque		Souche	
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée		Souche	
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées			Odeur de rave
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			Odeur de rave
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames			
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante			
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse		hêtre	
651	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.)Fayod	Cystoderme amiantacé			
Ordre : Agaricales					
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtee			
709,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lan	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois			
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile			
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutéé couleur de cerf		Bois mort	
870	<i>Pluteus boudieri</i> Orton	Plutéé de Boudier	<i>P. semibulbosus</i>	Bois mort	Marge striée
Ordre : Entolomatales					
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
Ordre : Cortinoriales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			Spores 5,5x3,5 µm
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse			
1254	<i>Pholiota tuberculosa</i> var. <i>curvipes</i> (Pers.) Roux	Pholiote à pied courbé	<i>P. curvipes</i>		
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quélet	Strophaire vert-de-gris			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		Bois mort	
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Watling	Simocybe olivâtre	<i>Simocybe c.</i>		
	Ordre : Russulales				
1375	<i>Russula fageticola</i> (Meizer)Lundell	Russule du hêtre		hêtre	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	
1577	<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagnesi	Lactaire très fauve			
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1654	<i>Xerocomus rubellus</i> Quélet	Bolet rougeâtre			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes		chêne	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Bois mort	
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1735.7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			