

Forêt de Sainte Apolline, 23 septembre 2017, 84 espèces			Commune : Plaisir		MEN : 2214C
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Tubifera ferruginosa</i> (Batsch)Gmelin	Tubifère couleur rouille			
DIVISION ZYGOMYCOTA					
0,2	<i>Spinellus fusifer</i> (Link) Tiegh.	Spinelle en fuseau		<i>Collybia dryophila</i>	
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.)	Lenzites tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilat	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
100,5	<i>Postia tephroleuca</i> (Fr. : Fr.) Jülich	Polypore souris	<i>Leptoporus lacteus</i> , <i>Oligoporus tephroleucus</i>		Chair non amère
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornona pyxidata</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
274	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe à pied clavé			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
278	<i>Clitocybe costata</i> Kühner & Romagnesi	Clitocybe côtelé	<i>Infundibulicybe c.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
442	<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull. : Fr.) Patouillard	Melanoleuca à pied strié			
502	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.:Fr.)Cooke & Quélet	Marasme à pied corné			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>	chêne	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus d.</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> <i>C. marasmioides</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
554	<i>Mycena flavescens</i> Velenovský	Mycène jaunâtre	<i>M. elegans</i> , <i>M. luteoalba</i> var. <i>sulphureomarginata</i>		
573,5	<i>Mycena abramsii</i> (Murrill)Murrill	Mycène printanière			
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i> , <i>Collybia gramocephala</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
704	<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittadini)Wasser	Lépiote pudique	<i>Lepiota naucina</i> , <i>Lepiota pudica</i>		
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée			
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lan	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psallote solitaire			
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre	<i>Coprinopsis a.</i>		
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
888	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditstm.Fr.)Kummer	Plutée veiné			
Ordre : Entolomatales					
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
968,5	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hausknecht & Noordeloos				
Ordre : Cortinariales					
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>		
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1173	<i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr. ->) Fr.	Cortinaire purpurescent			
1238,5	<i>Crepidotus malachus</i> (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.				Spores sphériques Ø 6,5-7,5 µm, chapeau blanc → 4cm
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiotte à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Watling	Simocybe olivâtre			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1544	<i>Lactarius blennioides</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1653,5	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.)Quélet	Bolet pruineux			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1701	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé		saule ?	
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estadès	Bolet rude gris-brun	<i>L. cyaneobasileucum</i> var. <i>brunneogriseolum</i>	bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Kr.	Vesse-de-loup en forme de poi	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			
1736	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.:Pers.	vesse-de-loup épineuse		hêtre	