

Forêt de Marly, gare de Saint-Nom, 7 octobre 2017, 95 espèces		Commune : L'Etang-la-Ville	MEN : 2214D		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
189	<i>Hygrocybe conica</i> (Scop.:Fr.)Kummer	Hygrophore conique			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
295,5	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers. : Fr.) Kumm. 1871	Clitocybe des feuilles			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>bulbigera</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
369	<i>Tricholoma pseudoalbum</i> Bon	Tricholome blanc			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
396	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé			
486,5	<i>Tephroclybe atrata</i> (Fr.:Fr.)Donk	Collybie noirâtre	<i>Lyophyllum atratum</i>	brûlis	
503	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Br.	Marasme globuleux	<i>M. globularis</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> C. <i>marasmioides</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
628	<i>Oudemansiella pudens</i> (Pers.)Pegler & Young	Collybie à poils ras	<i>Xerula p., O. longipes</i>		
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse	<i>Mucidula m.</i>	hêtre	
640	<i>Dermoloma atrocinereum</i> (Pers.) Orton	Tricholome gris sombre			
Ordre : Agaricales					
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues	<i>Lepiota acutesquamosa</i>		
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
Ordre : Amanitales					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		bouleau	
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa var. spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
868	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée brun d'ombre			
881	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée nain			
Ordre : Entolomatales					
902	<i>Entoloma lividum</i> (Bulliard->) Quélet	Entolome livide	<i>E. sinuatum</i>		
910	<i>Entoloma rhodopodium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre			
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1006	<i>Hebeloma edurum</i> Métrod ex Bon	Hébélome Belle-Hélène			
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radican			
1065	<i>Inocybe kuehneri</i> Stangl & Veselsky	Inocybe de Kühner	<i>I. eutheles pro parte ; I. sindonia</i>		
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet			
1159	<i>Cortinarius varius</i> (Sch. : Fr.) Fr. 1838	Cortinaire variable			
1166	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire à marge brisée			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1198,5	<i>Cortinarius causticus</i> Fr.	Cortinaire amer			
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>lividoochraceus</i>	hêtre	
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable	<i>Pholiota aurea, G. junonius</i>		
1244	<i>Pholiota squarrosa</i> (Müll. : Fr.) Kummer	Pholiote écailleuse			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques			
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fageticola</i>	hêtre	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1496	<i>Russula ochracea</i> Fr.	Russule ochracée			jaune
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1528	<i>Lactarius evosmus</i> Kühner	Lactaire à odeur de pomme			
1532	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lactaire à lait brûlant		noisetier	
1540	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Lactaire cerclé		charme	
1542	<i>Lactarius vietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire fané		bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérissant			
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krü	Vesse-de-loup en forme de po	<i>Lycoperdon piriforme</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		