

Etang du Moulin à Renard, 14 octobre 2017		84 espèces	Commune : Guyancourt	MEN : 2215B	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Pezizomycetes					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
34	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.)Fuckel	Pézize orangée			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllphoromycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycoleptodon ochraceum</i>		
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Giroлле, chanterelle			
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne	<i>P. corticatus</i> , <i>P. tephrotrichus</i>		
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
287,5	<i>Lepista flaccida</i> (Sow.:Fr.)Pat.	Clitocybe inversé des feuillus			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
295,5	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers. : Fr.) Kumm. 1871	Clitocybe des feuilles			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe bicolor	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>bulbigera</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
376	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Tricholome prétentieux, bise d'automne			
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
384	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Colombette			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
431	<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb.& Schw.:Fr.)Karsten	Ripartite poilu			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.& Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
539	<i>Hemimycena mairei</i> (Gilbert)Singer	Mycène de Maire	<i>Omphalia mairei</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouz.	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i> , <i>Collybia grammocephala</i>		
Ordre : Agaricales					
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues	<i>Lepiota acutesquamosa</i>		
672	<i>Lepiota ventriosospora</i> Reid	Lépiote à spores ventru	<i>L. metulaespora</i> , <i>magnispora</i>		
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
739	<i>Agaricus silvaticus</i> Schaeffer	Psallote des forêts			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
787,5	<i>Psathyrella albidula</i> (Romagn.) M. M. Moser 1967		<i>Psathyrella prona</i> f. <i>albidula</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
	Ordre : Amanitales				
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
	Ordre : Pluteales				
887	<i>Pluteus cinereofuscus</i> Lange	Plutée gris sombre			
	Ordre : Entolomatales				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
972	<i>Rhodocybe gemina</i> (Fr.)Kuyper & Noordeloos	Rhodocybe tronqué	<i>R. truncata</i> ; <i>Clitopilus geminus</i>		
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1183	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Henry	Cortinaire très élégant			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	<i>rosea</i>		
1490	<i>Russula pseudointegra</i> Arnoult & Goris	Russule coccinée			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison, Lactaire à coliques		bouleau	
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1623	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bulliard : Fr.) Quélet	Bolet châtaigne			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum</i> , <i>hirtum</i>		