

Forêt de Beynes, 1er novembre 2019, 102 espèces			Commune : Beynes	MEN : 2214C	
N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.)Fr.	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
106,5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Polypore élégant			
107	<i>Polyporus durus</i> (Timm) Kreisel, non Junghuhn	Polypore bai	<i>P. badius</i> , <i>Melanopus picipes</i>		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
122,5	<i>Phaeoclavulina flaccida</i> (Fries) Giachini (2011)	Clavaire élastique	<i>Ramaria flaccida</i>	pin	
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
189	<i>Hygrocybe conica</i> (Scop.:Fr.)Kummer	Hygrophore conique			
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
278	<i>Clitocybe costata</i> Kühner & Romagnesi	Clitocybe côtelé	<i>Infundibulicybe c.</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc		chêne	
391	<i>Tricholoma atosquamosum</i> (Chevalier->) Saccardo	Tricholome squameux			
396	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brulé		hêtre	
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépioste sordide			
502	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.:Fr.)Cooke & Quélet	Marasme à pied corné			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles	sur brindilles de bois tombés		
506	<i>Marasmiellus candidus</i> (Bolton)Singer	Marasme blanc			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée		pin	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	Mycène en capuchon	<i>Mycena gypsea</i>		
553	<i>Mycena filopes</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Mycène à odeur d'iode	<i>M. iodolens</i> ; <i>M. vitilis</i> ss. auct.		
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
594	<i>Mycena erubescens</i> v.Höhnel	Mycène amère		tronc moussu	
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphyla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i> , <i>Collybia grammacephala</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues	<i>Lepiota acutesquamosa</i>		
672	<i>Lepiota ventriosospora</i> Reid	Lépiote à spores ventruées	<i>L. metulaespora</i> , <i>magnispora</i>		
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
711	<i>Macrolepiota gracilentata</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée	<i>mastoidea</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
756	<i>Agaricus moelleri</i> Wasser	Agaric pintade	<i>A. meleagris</i> , <i>praeclaresquamosus</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			

N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	Ordre : Entolomatales				
902	<i>Entoloma lividum</i> (Bulliard->) Quélet	Entolome livide	<i>E. sinuatum</i>		
910,5	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.)Quélet	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. rhodopolium f. nidorosum</i>		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
968,5	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hausknecht & Noordeloos				
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1095,5	<i>Cortinarius venetus</i> (Fr.) Fr.	Cortinaire verdâtre			Odeur de persil
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1109	<i>Cortinarius azureovelatus</i> Orton	Cortinaire azuré-voilé			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1161	<i>Cortinarius largus</i> Buxb.ex Fr.	Cortinaire large			
1176,5	<i>Cortinarius dibaphus var. nemorosus</i> (Henry)Henry	Cortinaire sylvestre à robe de pour	<i>C. nemorosus</i>	hêtre	KOH rose sur chair
1185	<i>Cortinarius splendens</i> R. Henry1939	Cortinaire splendide, Cortinaire jaune d'œuf			
1194	<i>Cortinarius croceocaeruleus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Cortinaire bleu jaunissant			ped radican blanc
1198	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Cortinaire oint			
1199	<i>Cortinarius salor</i> Fr., non ss Quélet. (Grevillea)	Cortinaire couleur de mer			
1201	<i>Cortinarius trivialis</i> Lange	Cortinaire trivial		chêne	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1308	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bolbitie jaune d'oeuf	<i>B. titubans</i>		
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques			
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei var. fageticola</i>	hêtre	
1388	<i>Russula exalbicans</i> (Pers.)Melzer & Zvára	Russule pâlisante		bouleau	
1393	<i>Russula sardonía</i> Fr., ss Melzer & Zvára	Russule sardoine	<i>R. drimeia</i> Cooke	pin	
1467	<i>Russula faginea</i> Romagn.	Russule des hêtraies		hêtre	FeSO4 vert sombre
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné		chêne	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		bouleau	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		pin	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur		chêne	Odeur de pelargonium
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise		chêne	
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc, Lactaire non	<i>Lactarius fuliginosus var. albipes</i>		
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle			
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonnette voilée		pin	
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1675	<i>Boletus aereus</i> Bulliard : Fr.	Cèpe bronzé			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1683	<i>Boletus queletii</i> Schulzer	Bolet de Quélet			
1685	<i>Boletus lupinus</i> Fr.,ss Romagnesi, non ss Bres.	Bolet des loups	<i>Rubroboletus lupinus</i>	chêne	
1701	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.)S.F.Gray	Bolet orangé			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		