ANY - Association des Naturalistes des Yvelines

Compte rendu de la sortie du samedi 28 mars 2026, en forêt de Marly (78)

Objectif : Insectes du premier printemps en Forêt de Marly :
Groupe : 11 personnes
Météo : 10°C vent froid, avec des éclaircies.

Vestige de l'ancienne "forêt d'Yveline" qui s'étendait sur toute la plaine de Versailles, la forêt domaniale de Marly occupe une butte allongée et très fertile dans l'ouest parisien. Ce massif de 1 749 ha est composé presque exclusivement de feuillus, où chênes et châtaigniers sont rois. Une cinquantaine de mares offrent des conditions favorables à la présence d'une flore et d'une faune inféodées aux milieux humides.
La sortie s'est déroulée du côté de Ste Gemme en empruntant les allées forestières.



Crédits photos : Isabelle, Gilles, Jean-Marc
Ressource bibliographique : https://geonature.arb-idf.fr/

Le vol d'un papillon aurore mâle a accompagné le départ de la sortie, c'est l'espèce emblématique du premier printemps, difficile à photographier car toujours en mouvement.
Anthocharis cardamines (Lepidoptera, famille Pieridae).

Photo non prise sur site



Une autre Pieridae a été repérée, dissimulée dans un buisson d'orties : *Pieris napi* reconnaissable à ses nervures surlignées de grisâtre sur le revers des ailes postérieures.



Un petit papillon vient virevolter autour des branches, une adèle, impossible à déterminer sur photo, on restera donc au niveau du genre.

Adela sp (famille Adelidae).



Sur la végétation au sol des bordures du chemin, nous avons pu observer des Coccinelles à 7 points, *Coccinella septempunctata* (Coleoptera, famille Coccinellidae), des vols de Bibions (Diptera, famille Bibionidae) et…

Bibio lanigerus un mâle reconnaissable à ses yeux très développés.



…et un charançon. Le charançon du Frêne, *Stereonychus fraxini* (Coleoptera, famille Curculionidae) hiverne dans la litière. Il est monophage sur Frêne dont il troue les feuilles.



Un habitant commun des chemins forestiers amateur des crottins, lorsque ceux-ci ne sont pas contaminés par des vermifuges et autres antibiotiques, est le Géotrupe des bois, *Anoplotrupes stercorosus* (Coleoptera, famille Geotrupidae). Cette espèce de géotrupe se reconnaît aux rides transversales sur les inter-stries des élytres.



Un tas de troncs morts en bord de chemin a permis de très belles découvertes après quelques efforts pour dégager les écorces et les branches au sol.
Deux espèces de la famille des Anthribidae, insectes associés aux champignons des bois vermoulus de feuillus. Proches des Curculionidae, ils possèdent un rostre large et plat et des couleurs mimétiques de leur environnement.

L'Anthribe licheneux (*Platyrhinus resinosus*) pourvu d'un rostre particulièrement large.



L'Anthribe longicorne (*Platystomos albinus*), ici une femelle, le mâle a des antennes très longues.





Caché dans une anfractuosité, une coccinelle asiatique montre une des colorations de cette espèce très variable.

Harmonia axyridis (famille Coccinellidae).



Parmi la litière entourant les troncs, on a pu observer un juvénile du Grillon des bois, *Nemobius sylvestris* (Orthoptera , famille Trigonidiidae).



L'utilisation de la nappe japonaise en battant les jeunes frondaisons de charme a permis de collecter de nombreux spécimens de petites tailles.
Des charançons de la sous-famille des Entiminae caractérisés par un rostre court et carré.

Strophosoma capitatum au corps couvert d'écailles (squamules) arrondies.



Pour la détermination des *Strophosoma* voir « Petit Guide Illustré pour la détermination des Curculionidae Entiminae de la tribu des Brachyderini en Île-de-France » dans les fiches thématiques Entomologie sur le site de l'ANY.



Polydrusus tereticollis, avec des dessins blancs en chevron sur les élytres.



Polydrusus marginatus avec son écusson recouvert de squamules claires.

Une espèce proche des curculionidae, le cigarier du bouleau, *Deporaus betulae* (famille Attelabidae) confectionne des rouleaux en forme d'entonnoir à partir des feuilles de nombreux feuillus pour y pondre ses oeufs.



Des Coccinelles (famille Coccinellidae).



Coccinelle à 10 points blancs, *Calvia decemguttata*, espèce aphidiphage.
On peut apercevoir les critères propres aux Coccinellidae, palpe se terminant en hache, petite antenne filiforme et 3 tarses visibles à chaque patte.

Adalie à dix points, *Adalia decempunctata*, espèce aphidiphage aux couleurs très variables. Elle se différencie de la coccinelle asiatique, elle aussi très variable, par sa taille, (< 5mm pour l'adalie à 10 points, >5 mm pour la coccinelle asiatique) et par la bordure claire extérieure des élytres.





La coccinelle à damier, *Propylea-quatuordecimpunctata* se nourrit aussi de pucerons.



Bruchidius varius, (famille Chrysomelidae, sous-famille Bruchinae) cette espèce de bruche vit sur les trèfles.





Dasyte bleu, *Dasytes caeruleus* (famille Melyridae, sous-famille Dasytinae). Les larves chassent d'autres larves saproxylophages dans le bois déjà en décomposition.

Ordre Hemiptera
Lygus pratensis (famille Miridae).



Ordre Diptera
Otites nebulosa (famille Ulidiidae).



Grand Bombyle, *Bombylius major* (famille Bombyliidae)
Les adultes se nourrissent de nectar. Les larves parasitent les nids des abeilles solitaires.



Ordre Hymenoptera

Hyménoptère parasite.





La chrysope verte, *Chrysoperla carnea*, (Neuroptera, famille Chrysopidae), parfois appelée mouche aux yeux d'or. La larve est aphidiphage.

En battant des branches de Genêt à balais, *Cytisus scoparius*, observation d'un apion inféodé à cette plante, *Pirapion immune* (famille Brentidae, sous-famille Apioninae).



Une araignée s'est jointe aux découvertes entomologiques : l'épeire diadème, *Araneus diadematus*, (Arachnida, Araneae).



La fin de la sortie s'est concentrée sur la recherche de coléoptères de la famille des Carabidae (espèces hivernant dans le sol, sous les bois morts et les mousses), mais après avoir soulevé des dizaines de bois morts la seule espèce rencontrée a été le commun *Abax parallelepipedus*.

