ANY - Association des Naturalistes des Yvelines

Compte rendu de la sortie au Marais de Maincourt le 06 septembre 2026

Objectif : Insectes des milieux humides.
Groupe : 13 personnes
Météo : Soleil partiellement voilé.

Le marais de Maincourt est une ENS (Espace Naturel Sensible) qui fait partie d'une ZNIEFF de type 2 (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique). Ce marais est inclus dans le PNR (Parc Naturel Régional) de la haute vallée de Chevreuse. Il est situé sur des alluvions de fond de vallée. Ces alluvions reposent sur les sables de Fontainebleau (Stampien) qui se trouvent eux-mêmes sur des couches imperméables. On retrouve aux abords du marais, des bancs de grès et des résurgences nombreuses qui en expliquent le caractère humide ou marécageux. Ce marais se situe sur le cours d'eau amont de l'Yvette. Il abrite la plus grande roselière du PNR de la haute vallée de Chevreuse (roselière à *Phragmites australis*).

Après un été sec et caniculaire les pluies de ces dernières semaines ont rempli les mares d'une eau boueuse. Les observations entomologiques sont restées relativement limitées en nombre d'espèces et surtout marquées par une très faible abondance des populations notamment pour les odonates.



Crédits photo : Chantal, Gilles, Sébastien, Jean-Marc

Ordre : Hemiptera

Cicadella viridis (Linnaeus, 1758), la Cicadelle verte, ou Cicadelle du Jonc, famille des Cicadellidae. Espèce typique des lieux humides. Le mâle a des teintes bleues.







Un autre Cicadellidae, *Eupteryx urticae* (Fabricius, 1803), larve trouvée sur *Urtica dioica*.



Neottiglossa leporina (Herrich-Schäffer, 1830) de la famille des Pentatomidae. Vit principalement sur les graminées, ici sur une ortie.



Dicyphus epilobii Reuter, 1883, famille des Miridae, cet insecte vit sur *Epilobium*.

Le psylle de l'aulne, *Psylla alni* (Linnaeus, 1758) de la famille des Psyllidae. La larve vit sur les aulnes en s'entourant d'une sécrétion cireuse.



Cixius sp. de la famille des Cixiidae.





Caricosipha paniculatae Börner, 1939 de la famille des Aphididae. Puceron inféodé aux Carex, notamment les *Carex paniculata* qui forment des touradons dans les marais.

Ordre : Mecoptera

La Mouche-scorpion, *Panorpa germanica* Linnaeus, 1758, de la famille des Panorpidae, vit en zone humide, se nourrit de nectar et d'insectes.

Ici un mâle bien reconnaissable à son abdomen recourbé en forme de queue de scorpion.





Ordre : Coleoptera



Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758) de la famille des Carabidae est un insecte carnivore qui vit dans les zones humides.

Platynus assimilis (Paykull, 1790), Carabidae des zones marécageuses.





De la famille des Chrysomelidae, le Criocère des Céréales *Oulema melanopus* (Linnaeus, 1758)

Un autre Chrysomelidae, *Pyrrhalta viburni* (Paykull, 1799) obtenue au battage de *Viburnum opulus*.



Famille des Curculionidae, *Nedyus quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758) le petit charançon de l'ortie.







Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763) qui vit sur la Scrofulaire, en position de repli sur soi.



Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) de la famille des Brentidae, Vit sur la salicaire, plante vivace de milieu humide.



Parmi les Brentidae, la sous-famille des Apioninae se distingue par des insectes aux antennes non coudées, deux espèces ont été observées :

Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785), insecte de 2 à 3 mm de long.





Trichopterapion-holosericeum, c'est une première mention pour la base de données GeoNat'îdF.



Ordre : Orthoptera

Le Phanéroptère méridional, *Phaneroptera nana* Fieber, 1853, de la famille des Tettigoniidae.



Ordre : Lepidoptera

Chez les papillons rhopalocères, la piéride du navet était bien présente. Mais c'est surtout la vanesse Paon du jour qui a retenu l'attention :





Aglais io (Linnaeus, 1758), la génération automnale va hiverner pour se reproduire au printemps prochain. Chenille sur *Urtica dioica.*

Pour les hétérocères, observation de la chenille de la Découpure, *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758), qui se nourrit de feuilles de saules, bouleaux, peupliers.





Ordre : Hymenoptera



La tenthrède de la menthe, *Tenthredo marginella* Fabricius, 1793, de la famille des Tenthredinidae.

Les larves se développent sur la menthe et différentes espèces de plantain.



Larve de *Tenthredo scrophulariae* Linnaeus, 1758, sur une scrofulaire,



Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) de la famille des Formicidae, pratique la trophobiose où la fourmi protège les pucerons en échange de miellat sucré.



Ordre : Odonata

Famille Libellulidae

Le sympétrum strié, *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840), est reconnaissable à ses pattes noires à ligne jaune et surtout aux bandes jaunâtres sur les flancs du thorax





Le sympétrum sanguin, *Sympetrum sanguineum* (O.F. Müller, 1764), est identifiable à ses pattes totalement noires et à son front rouge foncé.





Le Leste vert occidental, *Chalcolestes viridis* (Vander Linden, 1825) de la famille des Lestidae se reconnaît à la dent sur le côté du thorax.



Deux belles espèces d'Aeshnidae nous ont fait l'honneur de leur vol rapide et changeant avec quelques sur-places pour l'Aeschne mixte.

Aeshna mixta Latreille, 1805





L'Aeschne bleue femelle, *Aeshna cyanea* (O.F. Müller, 1764) s'est posée dans les frondaisons.



Pour terminer ce compte rendu, quelques espèces d'araignées.

Marpissa radiata de la famille des Salticidae





La Pisaure admirable, *Pisaura mirabilis* de la famille des Pisauridae.





Metellina segmentata de la famille des Tetragnathidae.

Neriene montana de la famille des Linyphiidae aperçue dans le lavoir.





Phalangium opilio de la famille des Phalangiidae.