



Compte rendu de la sortie du samedi 23 mai 2026 à l'étang des écrevisses Vélizy-Villacoublay (78)

Objectif : Libellules

Groupe : 5 personnes

Météo : Ensoleillé, 32°C

L'objectif de la sortie est principalement l'observation des libellules présentes au niveau de l'étang des écrevisses et de l'étang de la patte d'oie situé à proximité.

Le froid, le vent, la pluie et la grêle de la semaine précédente nous ont donné quelques frayeurs, mais le beau temps est revenu 2 jours avant la sortie, et à notre arrivée à 10h, il faisait déjà 24°C sous un ciel sans nuage. Cette chaleur a favorisé l'émergence des libellules, qui étaient nombreuses à tourner autour de l'étang : une quinzaine d'espèces ont pu être observées.



Bien que situé en milieu périurbain (la ville sur un côté, la forêt de Meudon sur les 3 autres) et fréquenté par les sportifs, les familles et les pêcheurs, l'étang des écrevisses présente une assez grande richesse en odonates, dont plusieurs espèces protégées au niveau national ou en Ile-de-France.

Ses nénuphars sont propices au développement de la Leucorrhine à large queue et de la Naiade aux yeux rouges : ils leurs servent de support pour défendre leur territoire.

La végétation immergée est un abri pour le développement des larves.

Les roseaux qui bordent une partie de l'étang sont des supports d'observation ou des reposoirs pour de nombreuses espèces. Les larves remontent le long de leurs tiges pour effectuer leur mue.

On retrouve accrochées à la végétation ces mues, appelées exuvies, caractéristiques de chaque espèce.



Exuvie de *Libellula quadrimaculata*

Crédits photos : Isabelle, Jean-Marc, Cristi

Ressource bibliographique : <https://geonature.arb-idf.fr/>

Ordre Odonata
Sous-ordre Zygoptera

Famille Platycnemididae



L'agrion à larges pattes
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Famille Coenagrionidae



Agrion jouvencelle,
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)



Reconnaisable au dessin de son 2^{ème} segment abdominal en forme de U isolé du trait dessous.

Mâle au repos
Cœur copulateur : le mâle tient la femelle derrière la tête.
Couples en tandem et en position de ponte dans la végétation immergée

@Jean-Marc





Agrion mignon
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
 Liste des espèces protégées en Île-de-France.



Il se différencie par le motif de son 2^{ème} segment abdominal en forme de tête de chat ou de diapason, ses segments 6 et 7 entièrement noirs, et le 5^{ème} à moitié noir.

Agrion élégant, *Ischnura elegans* (Vander Linden, 1820)

La livrée de l'agrion élégant varie en fonction de son degré de maturité et de son sexe...





Petite nymphe au corps de feu,
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)



Naïade aux yeux rouges, *Erythromma najas* (Hansemann, 1823)

Mâle posé sur une feuille flottante.
Il effectue de brefs vols au-dessus de
l'eau et se repose.

Sous-ordre Anisoptera

Famille Libellulidae

Crocothémis écarlate femelle,
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)



Genre Libellula



Libellule à quatre taches,
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Espèce déterminante de l'inventaire ZNIEFF
région IdF
Nombreux individus sur l'étang



Libellule déprimée femelle,
Libellula depressa (Linnaeus, 1758)

Sur l'étang de la patte d'oye.
En vol, elle ressemble à un frelon géant !
Des mâles ont aussi été vus.

Espèce commune en Europe.
Apprécie les points d'eau de petite taille, peu
profonds et ensoleillés.

Libellule fauve, *Libellula fulva* (O.F. Müller, 1764)
Espèce déterminante de l'inventaire ZNIEFF région IdF



Le genre *Orthetrum* se différencie du genre *Libellula* par l'absence de tache à la base des ailes. Ces dernières sont dites « hyalines ».



Orthétrum réticulé
Orthetrum cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Un seul individu observé, une femelle, avec sa coloration brun jaune (le mâle est bleu-gris).

Apprécie de se poser sur des endroits dégagés : sol nu, pierres.

Présent partout en France.

Genre *Leucorrhinia*


Leucorrhine à large queue, mâle. *Leucorrhinia caudalis* (Charpentier, 1840)

Liste des espèces protégées au niveau national

Liste rouge régionale des libellules d'Île-de-France, catégorie Vulnérable.

Espèce déterminante de l'inventaire ZNIEFF région IdF

Déjà aperçue lors de la sortie ANY de juin 2025 à l'étang des écrevisses, la Leucorrhine à large queue (du grec leucos : blanc, et rhinos : nez) est toujours bien présente, avec plusieurs individus mâles défendant leur territoire.



©Jean-Marc

©isabelle

Famille Corduliidae





Cordulie bronzée,
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

Espèce relativement abondante sur l'étang des écrevisses.
Les mâles territoriaux patrouillent du lever au coucher du soleil le long des berges.
Ils se posent rarement.

Famille Aeshnidae

Anax empereur, *Anax imperator* (Leach, 1815).

De 66 à 84mm de long, l'Anax empereur se reconnaît à sa grande taille, son thorax tout vert, et son abdomen bleu et noir. En vol, les mâles ont l'abdomen légèrement arqué vers le bas. Femelle en ponte.



Anax napolitain
Anax parthenope (Selys, 1839)

De 62 à 75mm de long.
Sa coloration terne fait ressortir le vert de ses yeux et le bleu azuré de sa « selle ».

Un bref repos en fin de journée...

Ordre Lepidoptera
Famille Choreutoidea



Anthophila fabriciana (Linné, 1767)

Anthophila veut dire « qui aime les fleurs » et fabriciana est une dédicace à Fabricius (1745-1808), élève et disciple de Linné, qui a décrit et nommé près de 10000 espèces d'insectes, trois fois plus que Linné lui-même.

Famille Erebidæ



Chenille de la Lithosie quadrille,
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)

Le papillon vole de juin à octobre

Ordre Hemiptera
Famille Cercopidae



Cercope sanguin - *Cercopis vulnerata* - (Rossi, 1807)

Sa livrée rouge est dite aposématique : elle est un moyen de défense comme signal visuel de toxicité pour d'éventuels prédateurs.

Sa deuxième arme défensive est le saut : il peut se propulser d'un bond pouvant aller jusqu'à 70 cm lorsqu'il est dérangé.

C'est un insecte suceur de sève.

Ordre Coleoptera
Famille Cerambycidae



Petit capricorne –
Cerambyx scopolii (Fuessly, 1775)

Ce couple de petits capricornes était bien caché sous de grandes ombelles de sureau, mais il a été trahi par son mouvement.

Les adultes se nourrissent de pollen, principalement des fleurs en ombelles (aubépine, sureau, troène...) sur les lisières et clairières de forêts, les chemins forestiers, les haies.

Les femelles recherchent des arbres feuillus déjà fragilisés, en particulier des vieux fruitiers mais aussi du bois fraîchement coupé pour y pondre.

Famille Chrysomelidae



Donacia marginata (Hoppe, 1795)

Apprécie fortement les iris et roseaux sur les berges de l'étang.

Les larves qui vivent dans l'eau se nourrissent de plantes aquatiques. Les adultes émergent au printemps.



Galéruque de l'aulne

Agelastica alni (Linnaeus, 1758)

Famille Melyridae
Sous-famille Malachiinae



Malachie à deux points,
Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)



Famille Elateridae
Athous haemorrhoidalis
(Fabricius, 1801)

Famille Cantharidae

Le Téléphore livide, *Cantharis livida* (Linnaeus, 1758)



Ordre Diptera
Famille Micropezidae



Neria cibaria (Linnaeus, 1758)

Ordre Mecoptera
Famille Panorpidae



Mouche scorpion
Panorpa germanica (Linnaeus, 1758)