

Forêt de Dourdan, La croix de Nemours, 30 octobre 2016, 126 espèces		MEN : 2216A	Commune : Dourdan (91)		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
4.1	<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers. : Fr.) Fr.			noisetier	
4.2	<i>Annulohypoxylon multifforme</i> (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rog	Hypoxylon multifforme	<i>Hypoxylon multifforme</i>	bouleau	
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois		hêtre	
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			Spores étroites 6-10 µm
Classe : Pezizomycetes					
34	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.)Fuckel	Pézize orangée			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphomycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
79.5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé			
80.7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
83	<i>Grifolia frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
86.5	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz		pin	
90.5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90.6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>	bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
96	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden	Tramète lilas	<i>Coriolus abietinus</i>	pin	
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
100.5	<i>Postia tephroleuca</i> (Fr. : Fr.) Jülich	Polypore souris	<i>Leptoporus lacteus, Oligoporus tephroleucus</i>		
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en trompette	<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.:Fr.		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i>		
115.5	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen:Fr.)Fr.	Clavaire crépue		pin	
116.5	<i>Clavulina rugosa</i> (Bulliard : Fr.) Schröter	Clavaire rugueuse	<i>Clavaria grossa</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne	<i>P. corticatus, P. tephrot</i>	chêne	
274	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe à pied clavé			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
296	<i>Clitocybe candicans</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Clitocybe blanchi			
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolore	<i>C. bicolor</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>	Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
353	<i>Laccaria bicolor</i> (Maire) Orton	Laccaire bicolore			
355	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.:Fr.)Cooke	Laccaire laqué			spores elliptiques
384	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Colombette		chêne	
494.5	<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar	Marasme des feuilles de chênes	<i>Selutipes q.</i>		
503	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Br.	Marasme globuleux	<i>M. globularis</i>		
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>	chêne	
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
523	<i>Collybia aquosa</i> (Bulliard:Fr.) Kummer	Collybie aqueuse	<i>Gymnopus a., C. oedipus, C dryophila var. aquosa</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris	<i>Collybia conigena</i>	sur cônes de pin	
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	Mycène en capuchon	<i>Mycena gypsea</i>		
553.4	<i>Mycena xantholeuca</i> Kühn. 1938	Mycène blanche et jaune			couleur blanche
556	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Mycène olivâtre	<i>M. olivascens, M. oortiana</i>		
566	<i>Mycena purpureofusca</i> (Peck) Saccardo 1887	Mycène pourpre foncé		pin	Chapeau brun rougeâtre, arête des lames violacée, aspect général de filopes
573.5	<i>Mycena abramsii</i> (Murrill)Murrill	Mycène printanière			
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée			
593	<i>Mycena vulgaris</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène vulgaire			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprées	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kottaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Mucidule radicante	<i>Collybia radicata</i>		
651.2	<i>Cystoderma amianthinum</i> f. <i>rugosoreticulatum</i> (Lorin)	Cystoderme amiantacé			
Ordre : Agaricales					
711	<i>Macrolepiota gracilentata</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		cèdre	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855.5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
869	<i>Pluteus punctipes</i> P.D. Orton 1960				chapeau marron couvert de petites mèches brunes dressées, formées de longues cellules fusiformes ; cheilocystides de formes diverses ; ponctuations noires vers la base du pied
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion	<i>P. fayodii</i>		
901	<i>Volvariella gloiocephala</i> (DeCand.:Fr.)Boekhout & En	Volvaire visqueuse	<i>speciosa</i>	pelouse	
	Ordre : Entolomatales				
913	<i>Entoloma sordidulum</i> (Kühner & Romagnesi) Orton		<i>Rhodophyllus sordidulus</i>		Pied soyeux ; spores subsphériques
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1041.5	<i>Inocybe obscurobadia</i> (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz.		<i>tenuicystidiata</i> , <i>leptocystis</i>		
1074.5	<i>Inocybe leptophylla</i> Atkinson		<i>lanuginosa</i> fo. <i>casimirii</i>		Pas de pleurocystides, spores à très nombreuses bosses
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées			
1092	<i>Rozites caperatus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Pholiote ridée	<i>Cortinarius c.</i>		
1121	<i>Cortinarius uliginosus</i> Berkeley	Cortinaire des marais			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1139	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté			
1145.5	<i>Cortinarius subbalaustinus</i> Rob. Henry 1985	Cortinaire des bouleaux			
1173	<i>Cortinarius purpurascens</i> (Fr. ->) Fr.	Cortinaire purpurescent			
1198.5	<i>Cortinarius causticus</i> Fr.	Cortinaire amer			Cuticule amère et chair douce
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable	<i>Pholiota aurea</i> , <i>G. junonius</i>		
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée		pin	
1234	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Tubaire voilée			spores amygdaliformes
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote à pied arqué	<i>curvipes</i>		
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>cyanea</i>		
1294	<i>Hypholoma ericaeoides</i> Orton			Mare	
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Watling	Simocybe olivâtre	<i>Simocybe c.</i>		
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1370	<i>Russula betularum</i> Hora	Russule des bouleaux	<i>R. emetica</i> var. <i>betular</i>	bouleau	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1393	<i>Russula sardonica</i> Fr., ss Melzer & Zvára	Russule sardoine	<i>R. drimeia</i> Cooke	pin	
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			FeSO4 orange
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	<i>rosea</i>		
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1577.5	<i>Lactarius britannicus</i> fo. <i>pseudofulvissimus</i> Reid 19	Lactaire soyeux			
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire déperissant			
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières			
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonnette voilée		pin	
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers		pin	
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			Chair jaune immuable, couche rouge sous la cuticule, spores très allongées
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum</i> , <i>hirtum</i>		
1735.5	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.Pers.	Vesse-de-loup fétide	<i>L. foetidum</i>		