

Forêt de Rambouillet, Rochers d'Angennes, 10 octobre 2020, 84 espèces					MEN : 2115D		Commune : Poigny-la-Forêt
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques		
DIVISION ASCOMYCOTA							
Classe : Sordariomycetes							
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois					
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables			sur feuilles d'érable		
Classe : Leotiomycetes							
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert					
Classe : Pezizomycetes							
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue					
DIVISION BASIDIOMYCOTA							
Classe : Homobasidiomycetes							
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae							
62	<i>Merulioopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		sur branche morte		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute					
80,4	<i>Phellinus robustus</i> (Karsten)Bourdot & Galzin	Faux amadouvier			chêne		
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		bouleau		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau			bouleau		
92	<i>Lenzites betulinus</i> (L.:Fr.)Fr.	Lenzite du bouleau	<i>L. flaccidus</i>				
100,5	<i>Postia stiptica</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	Polypore amer	<i>Oligoporus stypiticus</i> (Pers.:Fr.)Gilberts.			amère	
102	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.	Schizophylle commune			bouleau		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i>				
Sous-classe : Agaricomycetideae							
Ordre : Tricholomatales							
299	<i>Clitocybe phaeoptalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>hydrogramma</i>				
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel					
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle			Mousse		
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>				
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	<i>flavobrunneum</i>		bouleau	Quand on gratte le pied, la chair est jaune en dessous	
503	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Br.	Marasme globuleux	<i>M. globularis</i>			blancs	
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>				
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>				
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>				
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> C. <i>marasmioides</i>				
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes					
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Marasmius urens</i>				
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue-de-souris	<i>Collybia conigena</i>		cône de pin		
555	<i>Mycena metata</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Mycène conique	<i>Mycena amygdalina</i>				
577	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Mycène à odeur de chlore	<i>chlorinella</i>				
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié					
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide					
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque					
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure				Odeur de radis	
613	<i>Mycena rorida</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Mycène à pied gluant	<i>Roridomyces roridus</i>			Pied totalement viqueux	
Ordre : Agaricales							
657,5	<i>Echinoderma jacobi</i> (Vellinga & Knudsen) Gminder (2003)	Lépiote d Jacob	<i>Lepiota langei</i> , <i>L. eriophora</i>			Chapeau ø1,3 cm, petites verrues sur chapeau, lames blanches. Espèce rare des milieux frais	
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues	<i>Lepiota acutesquamosa</i>			Lames fourchues	
666	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Lépiote à demie nue					
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée					
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombolz) Wasser	Lépiote gracie	<i>M. rickenii</i> (Vel.) <i>Bellu & Lanzoni</i>				
713	<i>Chlorophyllum rhacodes</i> (Vittadini) Vellinga (2002)	Lépiote déguenillée	<i>Macrolepiota rhacodes</i>				
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Baria) Bellu & Lanzoni	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>			pied chiné et brunissant à la blessure	
739	<i>Agaricus silvaticus</i> Schaeffer	Psallote des forêts			pin		
746	<i>Agaricus arvensis</i> Sch.:Fr.	Agaric des jachères, Boule-de-neige			pelouse	Spores 7 x 4,5 µm sans PG	
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>			Spores en mitre d'évêque	
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin noir d'encre	<i>Coprinopsis a.</i>				
Ordre : Amanitales							
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches					
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte					
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine					
857	<i>Amanita porphyria</i> Albertini & Schweiniz : Fr.	Amanite porphyre					
Ordre : Pluteales							
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf					
881	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée nain				Chapeau brun chaud un peu veinulé	
Ordre : Entolomatales							
910	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Entolome gris rosâtre					
Ordre : Cortinariales							
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébelome échaudé					
1020	<i>Inocybe cookei</i> Bresadola	Inocybe à odeur de miel				à odeur de miel, sans cystides, toxique	
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet					
1048	<i>Inocybe tarda</i> Kühner	Inocybe tardif			pin	Chapeau brun, odeur spermatique, spores 9 x 5,5 µm ; cystides métuloïdes fusiformes	
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			pin		
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée					
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable					
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes					
Ordre : Russulales							
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées				Chair rougissante à la coupe puis noirissante	
1388	<i>Russula exalbicans</i> (Pers.)Melzer & Zvára	Russule pâlisante			bouleau	tres piquante	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1393	<i>Russula sardonia</i> Fr., ss Melzer & Zvára	Russule sardoine	<i>R. drimeia</i> Cooke	pin	
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1433	<i>Russula versicolor</i> J.Schaeffer	Russule versicolore		bouleau	chair piquante
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		chêne	à odeur de fruits de mer
1499	<i>Russula turci</i> Bresadola	Russule de Turco		pin	Douce, Gaïc 0 puis ++, lames jaunes
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1501	<i>Russula claroflava</i> Grove	Russule jaune clair		bouleau	
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	
1542	<i>Lactarius vietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire fané		bouleau	
1553	<i>Lactarius quieticolor</i> Romagn. 1958	Lactaire orangé gris, Lactaire à couleur de quietus		pin	Pied scrobiculé, lait carotte, proche de deliciosus
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			possibles <i>Paxillus cuprinus</i> aussi
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonnette voilée		pin sylvest	Bolet à anneau
1653,8	<i>Xerocomus cisalpinus</i> Simonini, Ladumer & Peintner	Bolet d'Italie	<i>Xerocomellus c.</i>		Chair du pied bleuissante
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai	<i>Imleria badia</i>		
1705	<i>Leccinum nigellum</i> Redeuih (1995)	Bolet rude noir			Pseudo réseau sur pied
1705,5	<i>Leccinum aerugineum</i> (Fr.)Lannoy & Estades	Bolet rude vert de gris		bouleau	Chapeau vert. Espèce rare sous <i>Belula pubescens</i> avec sphaignes, dans les marais
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris-brun	<i>L. cyaneobasileucum</i> var. <i>...</i>	bouleau	bleu turquoise à la base du pied
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			
1737	<i>Vascellum pratense</i> (Pers.:Pers.)Kreisel	Vesse-de-loup des prés		pelouse	