

Forêt de Marly, Étoile de Montaigny, 15 octobre 2022		131 espèces	Communes : Fourqueux, Chambourcy MEN : 2214B		
N° cd	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
Classe : Leotiomycetes					
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante		chêne	
Classe : Pezizomycetes					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
30	<i>Otidea onotica</i> (Pers. : Fr.) Fuckel	Oreille de lièvre			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycetes					
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas			
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>P. faginea</i>		
70	<i>Thelephora terrestris</i> (Ehrhart : Fr.) Fr.	Théléphore terrestre			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90,5	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau	<i>Piptoporus betulinus</i>	bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bulliard) Bondartsev & Singer	Lenzite tricolore	<i>D. confragosa</i> var. <i>tricolor</i> , <i>Lenzites tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée			
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J.Schröt	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
117,2	<i>Clavulinopsis helvola</i> (Persoon) Corner	Clavaire lumineuse	<i>Ramariopsis helvola</i>		
118	<i>Macrotrophula juncea</i> (Albertini & Schweinitz) P. Karsten	Clavaire filiforme	<i>M. filiformis</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
147	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacquin:Fr.)Kummer	Pleurote en huître		hêtre	
160,5	<i>Hohenbuehelia grisea</i> (Peck) Singer	Pleurote bleutée	<i>H. fluxilis</i> var. <i>grisea</i>	hêtre	Basides tétrasporiques, cystides terminées par une boule de mucus (gliophex)
277	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Persoon) Hamaia	Clitocybe en entonnoir	<i>Clitocybe gibba</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>A. bulbosa</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
363	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Tricholome à odeur de savon			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
454	<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr. : Fr.) Kühner & Maire				
485	<i>Lyophyllum rancidum</i> (Fr.:Fr.)Donk	Collybie à odeur rance	<i>Tephroclybe rancida</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>		
520	<i>Gymnopus fusipes</i> (Bulliard) Gray	Collybie à pied en fuseau	<i>Collybia fusipes</i>		
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>		
525	<i>Gymnopus erythropus</i> (Persoon) Antonín, Halling & Noordel	Collybie à pied rouge	<i>Collybia kuehneriana</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée			
596	<i>Mycena leucogala</i> (Cooke)Saccardo	Mycène à lait blanc var. noir	<i>M. galopus</i> var. <i>nigra</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
628	<i>Xerula pudens</i> (Persoon) Singer	Collybie à poils ras	<i>Oudemansiella pudens</i> , <i>O. longipes</i>		
629	<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen	Collybie radicante	<i>Oudemansiella radicata</i>		
631	<i>Mucidula mucida</i> (Schradler) Patouillard	Mucidule visqueuse	<i>Oudemansiella mucida</i>	hêtre	
Ordre : Agaricales					
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues	<i>Lepiota acutesquamosa</i>		
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
675	<i>Lepiota castanea</i> Quélet	Lépiote châtain			
711	<i>Macrolepiota rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni	Lépiote gracile	<i>M. gracilentia</i>		
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
769	<i>Coprinellus micaceus</i> (Bulliard) Vilgalys, Hopple & Jacq. Joh	Coprin micacé	<i>Coprinus micaceus</i>		spores 8,5x5µm mitriformes
780	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i>		
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	Ordre : Entolomatales				
910,5	<i>Entoloma rhodopolium</i> f. <i>nidosorum</i> (Fr.) Noord.	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. nidosorum</i>		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé			
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1019	<i>Inosperma maculatum</i> (Boudier) Matheny & Esteve-Raventós	Inocybe tâché	<i>Inocybe maculata</i>		spores 8-9x5-6 µm phaséoliformes
1028	<i>Inocybe fraudans</i> (Britzelmayr) Saccardo	Inocybe à odeur de poire	<i>I. piriodora</i>		
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Pk.) Gill.	Inocybe à lames terreuses v	<i>I. sublilacina</i> ?		
1052	<i>Inocybe euviolacea</i> E. Ludw.		<i>I. geophylla</i> var. <i>violacea</i>		
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1137	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr.	Cortinaire couleur de faon			KOH brun, spores 8-9x6 µm
1139	<i>Cortinarius flexipes</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Cortinaire à pied flexueux	<i>C. paleaceus</i> , <i>C. paleifer</i>		Odeur de Pelargonium
1183,5	<i>Cortinarius fulminatus</i> Reumaux				KOH rouge sang sur chapeau, gris rose sur chair, spores 9-10,5x5,5-6 µm, chapeau visqueux fauve cuivré
1201	<i>Cortinarius trivialis</i> Lange	Cortinaire trivial			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée	<i>G. autumnalis</i>		
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			spores 6 x 3,5 µm
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholote gommeuse			
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quélet	Strophaire vert-de-gris			
1268	<i>Stropharia cyanea</i> (Bulliard) Tuomikoski	Strophaire bleu	<i>S. caerulea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1315	<i>Pholiotina aporos</i> (Kits v.Waveren)Cléménçon	Conocybe printanier	<i>P. togularis sensu</i> Lge		
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard) Fr.	Russule noircissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques			
1357	<i>Russula farinipes</i> Romell	Russule à pied farineux			Gaïac nul, lent sur pied, chair très piquante
1359	<i>Russula insignis</i> Quélet	Russule rougissante			
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1374	<i>Russula mairei</i> Sing.	Russule émétique des hêtre	<i>R. fageticola</i>	hêtre	
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile			Gaïac nul
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante			
1467,5	<i>Russula elaeodes</i> (Bresadola)Bon	Russule jaune verdâtre			savoir douce, FeSO4 vert (groupe de xerampélines), chapeau vert olivacé à bord cannelé rose au bord
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1490	<i>Russula pseudointegra</i> Arnould & Goris	Russule coccinée			
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1512	<i>Lactarius controversus</i> (Pers.:Fr.)Pers.	Lactaire des peupliers			
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison		bouleau	
1532	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lactaire à lait brûlant		noisetier	
1540	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Lactaire cerclé		charme	spores 6x3,5 µm
1542	<i>Lactarius vietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire fané		bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1561	<i>Lactarius flavidus</i> Boudier	Lactaire jaune à lait violet			
1573	<i>Lactarius glycosmus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de noix de	<i>L. impolitus</i>	bouleau	
1576	<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex Bon	Lactaire fauve orangé			
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille			
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
1589	<i>Lactarius seriffuus</i> (DC. : Fr.) Fr.	Lactaire à lait séreux			
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc, Lactai	<i>L. fuliginosus var. albipes</i>		
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle			
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1631	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet)Pouzar	Bolet cramoisi	<i>Pulveroboletus cramesinus</i>		
1632	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille	Bolet poivré			
1653	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bulliard) Šutara	Bolet à chair jaune	<i>Xerocomus chrysenteron</i>		Chair jaune faiblement bleuissante, rouge sous la cuticule
1653,8	<i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Klofac	Bolet d'Italie	<i>Xerocomus cisalpinus</i>		Chair blanche, rouge en bas du pied, bleuissant rapidement dans la moitié inférieure du pied
1657	<i>Imleria badia</i> (Fries) Vizzini	Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>		
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1701	<i>Leccinum albstipitarium</i> Den Bakker & Noordeloos	Bolet orangé	<i>L. aurantiacum s. auct</i>		Possibles Bolets orangés des chênes aussi
1706	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenbach) Mikšík	Bolet rude des charmes	<i>Leccinum carpini</i>	charme	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bulliard) Persoon	Scléroderme verruqueux			
1733	<i>Apioperdon pyriforme</i> (Schaeffer) Vizzini	Vesse-de-loup en forme de	<i>Lycoperdon pyriforme</i> , <i>Morganella pyriformis</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			
1742	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.:Pers.)Willdenow	Cyathe strié			