

| Bois de Morval, 19 novembre 2022, 53 espèces |   | Communes : Guiry-en-Vexin (95)   |   | MEN : 2213A |   |
|--|---|----------------------------------|---|-------------|---|
| N° CD  | Espèce  | Nom français                     | Synonyme  | Habitat     | Remarques   |
| <b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>                   |   |                                  |   |             |   |
| <b>Classe : Sordariomycetes</b>              |   |                                  |   |             |   |
| 7  | <i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville                             | Xylaire du bois                  |   |             |   |
| <b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>                |   |                                  |   |             |   |
| <b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>        |   |                                  |   |             |   |
| 47   | <i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein                    | Oreille de judas                 |   |             |   |
| 48   | <i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.                     | Oreille mésentérique             |   |             |   |
| <b>Classe : Homobasidiomycetes</b>           |   |                                  |   |             |   |
| <b>Sous-classe : Aphylophoromycetideae</b>   |   |                                  |   |             |   |
| 62   | <i>Byssomerulius corium</i> (Persoon) Parmasto                        | Mérule papyracée                 | <i>Meruliopsis corium</i> , <i>Merulius papyrinus</i> |             |   |
| 63   | <i>Phlebia tremellosa</i> (Schradler) Nakasone & Burdsall             | Mérule tremblante                | <i>Merulius tremellosus</i>                           |             |   |
| 76,1   | <i>Hydnum repandum</i> var. <i>album</i> (Quél.) Rea                  | Pied-de-mouton                   |   |             | variété blanche   |
| 95   | <i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát                              | Tramète versicolore              |   |             |   |
| <b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>       |   |                                  |   |             |   |
| <b>Ordre : Tricholomatales</b>               |   |                                  |   |             |   |
| 189  | <i>Hygrocybe conica</i> (Scop.:Fr.)Kummer                             | Hygrophore conique               |   | pelouse     |   |
| 260  | <i>Hygrophorus carpini</i> Gröger                                     | Hygrophore des charmes           |   |             |   |
| 295,5  | <i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers. : Fr.) Kumm.                         | Clitocybe blanchi                | <i>C. dealbata</i>                                    |             |   |
| 296  | <i>Leucocybe candicans</i> (Persoon) Vizzini, P. Alvarado, G. Morer   | Clitocybe blanchi                | <i>Clitocybe candicans</i> , <i>C. gallinacea</i>     |             |   |
| 337  | <i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.:Fr.)Quél., ss K.et R.                | Omphale en coupe, O. cupulée     |   |             |   |
| 396  | <i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet                            | Tricholome gravé                 |   |             |   |
| 425  | <i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer                                | Lépiste sordide                  |   |             |   |
| 453  | <i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.:Fr.)Murr                          | Melanoleuca noir et blanc        | <i>M. vulgaris</i>                                    |             | probable  |
| 577  | <i>Mycena leptcephala</i> (Pers.:Fr.)Gillet                           | Mycène à odeur de chlore         | <i>M. chlorinella</i>                                 | pin         | sous pin, odeur chlorée. <i>Mycena</i> capillaripes très probable, à vérifier l'an prochain sur matériel frais (lames bordées de rose, pied chevelu à la base, odeur chlorée, cheilocystides, caulocystides compatibles avec <i>M. capillaripes</i> ) |
| 579  | <i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray                        | Mycène à pied strié              |   |             |   |
| 580  | <i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet                                     | Mycène à pied raide              |   |             |   |
| 588  | <i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet                                   | Mycène inclinée                  |   |             | sous réserve  |
| 589  | <i>Mycena maculata</i> Karsten  | Mycène tachée                    |   |             |   |
| 595  | <i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer                               | Mycène à lait blanc              |   |             |   |
| 609  | <i>Phloeomana hiemalis</i> (Osbeck) Redhead                           | Mycène d'hiver                   | <i>Mycena hiemalis</i>                                |             | blanche sur tronc moussu  |
| 612  | <i>Phloeomana speirea</i> (Fries) Redhead                             | Mycène groupée                   | <i>Mycena speirea</i>                                 |             |   |
| 641  | <i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fries) Singer ex Bon                    | Tricholome à lames triangulaires |   |             | Spores non amyloïdes, 5x4um, ovoïdes a presque globuleuses avec apicule bien visible  |
| 646  | <i>Rhodotus palmatus</i> (Bulliard:Fr.)Maire                          | Rhodotus palmé                   |   |             |   |
| <b>Ordre : Agaricales</b>                    |   |                                  |   |             |   |
| 714  | <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer                         | Coulemelle, Lépiote élevée       |   |             |   |
| 739  | <i>Agaricus silvaticus</i> Schaeffer                                  | Agaric des forêts                |   | pin         | chair rougissante   |
| 751  | <i>Agaricus semotus</i> Fr.   | Psalliote solitaire              | <i>A. purpurellus</i> ?, <i>A. dulcidulus</i>         |             | Odeur frangipane  |
| 764  | <i>Coprinellus disseminatus</i> (Persoon) J.E. Lange                  | Coprin disséminé                 | <i>Coprinus disseminatus</i>                          |             |   |
| 769  | <i>Coprinellus micaceus</i> (Bulliard) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johns | Coprin micacé                    | <i>Coprinus micaceus</i>                              |             |   |
| 776  | <i>Coprinopsis lagopus</i> (Fries) Redhead, Vilgalys & Moncalvo       | Coprin pied de lièvre            | <i>Coprinus lagopus</i>                               |             |   |
| 780  | <i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Moncalvo    | Coprin pie                       | <i>Coprinus picaceus</i>                              |             |   |
| <b>Ordre : Amanitales</b>                    |   |                                  |   |             |   |
| 820  | <i>Limacella glioderma</i> (Fr.)Earle                                 | Limacelle gluante                |   |             | Odeur de farine   |
| 842  | <i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray                          | Amanite rougissante, Golmotte    |   |             |   |
| <b>Ordre : Pluteales</b>                     |   |                                  |   |             |   |
| 901  | <i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (de Candolle) Vizzini, Contu & Jus  | Volvaire visqueuse               | <i>Volvariella gloiocephala</i> , <i>V. speciosa</i>  |             |   |
| <b>Ordre : Entolomatales</b>                 |   |                                  |   |             |   |
| 921  | <i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi)Trimbach                             | Entolome à pied grêle            | <i>E. leptopus</i> , <i>E. mammosum</i>               |             |   |
| 927  | <i>Entoloma sericeum</i> Quélet                                       | Entolome soyeux                  |   |             |   |
| 947  | <i>Entoloma incanum</i> (Fr. : Fr.) Hesler                            | Entolome à pied vert             |   |             | Pied vert - espece rare!  |
| <b>Ordre : Cortinariales</b>                 |   |                                  |   |             |   |
| 1166   | <i>Cortinarius infractus</i> (Pers.:Fr.)Fr.                           | Cortinaire à marge brisée        |   |             | Spores globuleuses 7,5x6µm  |
| 1228   | <i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner                              | Galère marginée                  | <i>G. autumnalis</i>                                  |             |   |
| 1288   | <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer                        | Hypholome en touffes             |   |             |   |
| 1304   | <i>Agrocybe pediades</i> (Fr.:Fr.)Fayod                               | Agrocybe des pelouses            |   |             |   |
| 1308   | <i>Bolbitius titubans</i> (Bulliard) Fries                            | Bolbitie jaune d'oeuf            | <i>B. vitellinus</i>                                  | pelouse     |   |
| 1342   | <i>Panaeolina foenicicii</i> (Pers.:Fr.)Maire                         | Panéole des moissons             | <i>Panaeolus foenicicii</i>                           | pelouse     |   |
| <b>Ordre : Russulales</b>                    |   |                                  |   |             |   |
| 1523   | <i>Lactarius pubescens</i> Fr.  | Lactaire pubescent               |   | bouleau     |   |
| <b>Ordre : Boletales</b>                     |   |                                  |   |             |   |
| 1611   | <i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.                             | Paxille enroulé                  |   |             |   |

| N° CD                                 | Espèce   | Nom français                    | Synonyme   | Habitat | Remarques                         |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------|-----------------------------------|
| 1612                                  | <i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara       | Paxille à pied noir             | <i>Paxillus atrotomentosus</i>                             | pin     |                                   |
| 1613                                  | <i>Tapinella panuoides</i> (Fries) E.-J. Gilbert     | Paxille faux Panus              | <i>Paxillus panuoides</i>                                  | pin     |                                   |
| 1618                                  | <i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeffer : Fr.) Miller | Gomphide visqueux               | <i>Gomphidius viscidus</i>                                 | pin     | Base du pied non verte à la coupe |
| 1644                                  | <i>Suillus collinitus</i> (Fr.)Kuntze                | Bolet à mycélium rose           |  | pin     |                                   |
| <b>Sous-classe : Gasteromycetidae</b> |  |                                 |  |         |                                   |
| 1725                                  | <i>Tulostoma brumale</i> Pers. : Pers.               | Tulostome des brumes            |  | prairie |                                   |
| 1733                                  | <i>Apioperdon pyriforme</i> (Schaeffer) Vizzini      | Vesse-de-loup en forme de poire | <i>Lycoperdon pyriforme</i> , <i>Morganella pyriformis</i> |         |                                   |
| 1741                                  | <i>Cyathus olla</i> (Batsch:Pers.)Pers.              | Cyathe en coupe                 |  |         |                                   |