

Forêt de Marly, Etoile de Montaigu, 14 octobre 2023		28 espèces		Commune : Fourqueux		MEN : 2214B	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques		
DIVISION ASCOMYCOTA							
Classe : Sordariomycetes							
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables			sur feuilles d'érable		
DIVISION BASIDIOMYCOTA							
Classe : Homobasidiomycetes							
Sous-classe : Aphyllorphomycetideae							
70	<i>Thelephora terrestris</i> (Ehrhart : Fr.) Fr.	Théléphore terrestre					
90,7	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bulliard) Bondartsev & S	Lenzite tricolore	<i>D. confragosa</i> var. <i>tricolor</i>				
Sous-classe : Agaricomycetideae							
Ordre : Tricholomatales							
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>				
396	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé					
520	<i>Gymnopus fusipes</i> (Bulliard) Gray	Collybie à pied en fuseau	<i>Collybia fusipes</i>				
525	<i>Gymnopus erythropus</i> (Persoon) Antonin, Halling &	Collybie à pied rouge	<i>Collybia kuehneriana</i>				
629	<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen	Collybie radicante	<i>Oudemansiella radicata</i>				
Ordre : Agaricales							
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>Psalliota flavescens</i>				
782	<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bulliard) Patouillard	Lacrymaire velouté	<i>Psathyrella lacrymabunda</i>				
803	<i>Candolleomyces candolleanus</i> (Fries) D. Wächter	Psathyrelle de De Candolle	<i>Psathyrella c.</i>				
Ordre : Amanitales							
832,5	<i>Amanita lividopallescens</i> var. <i>tigrina</i> Romagn. ex	Amanite tigrée	<i>A. fraudulenta</i>	charme			
Ordre : Cortinariales							
1001	<i>Hebeloma sacchariolum</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée			Odeur de fleur d'oranger, Spores 10-12 x 6-6,5 µm Q 1,65-2		
1028,5	<i>Inocybe incarnata</i> Bresadola		<i>I. piriodora</i> var. <i>incarnata</i>		Spores 9 x 6,5-7 µm, cystides métuloïdes fusiformes, odeur faible, chapeau ø 5 cm roussâtre		
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames					
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Pk.) Gill.	Inocybe à lames terreuses var. lilas	<i>I. sublilacina</i> ?				
1055	<i>Inocybe flocculosa</i> (Berk.) Saccardo	Inocybe flocculeux			Spores 8,5-9 x 5-6 µm, cystides métuloïdes 60 x 14 µm fusiformes, odeur spermatique, chapeau ø 3,5 cm feutré ochracé pâle à mamelon ocre, pied poudré en haut,		
1106,5	<i>Cortinarius urbicus</i> (Fries) Fries	Cortinaire citadin			Spores 8-8,2 x 4,5-5 µm, pied 6cm blanchâtre clavé ou à bulbe arrondi à voile blanc formant une gaine, chapeau beige ochracé ø 4cm		
1166,5	<i>Cortinarius anfractoides</i> Hry				Gaïac nul sur chair (contrairement à infractus), Spores 8,2 x 6,5 µm		
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou					
1254,5	<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch)Quélet			à terre sur bois enterré	Spores 8,5 x 5 µm, cystides non capitées		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes					
Ordre : Russulales							
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		Chair un peu piquante		
1405	<i>Russula maculata</i> Quélet	Russule maculée			Lames piquantes jaunes, Gaïac nul		
1460	<i>Russula romellii</i> R.Maire	Russule à lames fragiles					
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie					
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon					
Sous-classe : Gasteromycetideae							
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé					