

Forêt domaniale de Beynes, 05 Novembre 2023, 128 espèces					
N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	DIVISION ZYGOMYCOTA				
0,2	<i>Spinellus fusiger</i> (Link) Tiegh.	Spinelle en fuseau		<i>Collybia dryophila</i>	
	DIVISION ASCOMYCOTA				
	Classe : Leotiomycetes				
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Pézize turquoise			
	Classe : Pezizomycetes				
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
20	<i>Helvella lacunosa</i> Afz.:Fr.	Helvelle lacuneuse			
30,1	<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Masee	Otidée couleur de cuir			
	DIVISION BASIDIOMYCOTA				
	Classe : Phragmobasidiomycètes				
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée	<i>Naematelia aurantia</i>		
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin	
	Classe : Homobasidiomycetes				
	Sous-classe : Aphylophoromycetideae				
63,6	<i>Vitreoporus dichrous</i> (Fries) Zmitrovich	Tramète bicolore	<i>Gloeoporus dichrous</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-mouton			
81	<i>Ganoderma lucidum</i> (W.Curtis:Fr.)Karsten	Ganoderme luisant			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de bœuf			énorme exemplaire
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90,5	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau	<i>Piptoporus betulinus</i>	bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue			
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J.Schröt	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
	Sous-classe : Agaricomycetideae				
	Ordre : Tricholomatales				
235	<i>Hygrophorus fagi</i> G. Becker & Bon	Hygrophore du hêtre	<i>H. penarius</i> syn.	hêtre	blanc, non visqueux
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
256	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bulliard : Fr.) Fr.	Hygrophore blanc d'ivoire			
260	<i>Hygrophorus carpini</i> Gröger	Hygrophore des charmes			blanc, très visqueux, centre ocre, pas de réaction à la potasse, spores 8µm
268	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Hygrophore à dents jaunes			
277	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Persoon) Harmaja	Clitocybe en entonnoir	<i>Clitocybe gibba</i>		
287	<i>Paralepista inversa</i> (Scopoli) Raitelhuber	Clitocybe inversé	<i>Lepista inversa</i>		
287,5	<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizini	Clitocybe inversé des feuillus	<i>Lepista flaccida</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles	<i>C. cerussata</i>		
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler	<i>C. hydrogramma</i> , <i>Singerocybe phaeophthalma</i>		
303	<i>Clitocybe fragrans</i> (Withering:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé strié			
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
315	<i>Armillaria cepistipes</i> Velenovský	Armillaire à pied clavé			
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
370	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sow. : Fr.) Quélet	Tricholome disjoint			
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufre			
396	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
426	<i>Lepista sordida</i> var. <i>lilacea</i> (Quélet) Bon	Lépiote lilas			
450,5	<i>Melanoleuca polioleuca</i> var. <i>langei</i> (Boekhout) Bon		<i>M.langei</i> , <i>M. br.</i>	sur fumier	
502	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.:Fr.)Cooke & Quélet	Marasme à pied corné			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>		
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>		
534	<i>Marasmiellus peronatus</i> (Bolton) J.S. Oliveira	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i> , <i>Collybia peronata</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue-de-souris	<i>Collybia conigena</i>		
562	<i>Mycena capillaripes</i> Peck	Mycène à pied chevelu			petit mycène rose à lames bordées
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphyla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i>		
644	<i>Leucocortinarius bulbiger</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Singer	Faux-cortinaire bulbeux			
	Ordre : Agaricales				
668	<i>Lepiota ignivolva</i> Bousset & Jossierand ex Jossierand	Lépiote à base rouge			
672	<i>Lepiota magnispora</i> Murrill	Lépiote à spores ventruées	<i>L. ventriospora</i>		
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			

680	<i>Lepiota subincarnata</i> J.E. Lange	Lépiote de Jooserand	<i>L. josserandii</i>		cuticule : trichoderme pur, spores plus petites que helveola, pas d'anneau
711	<i>Macrolepiota rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni	Lépiote gracile	<i>M. gracilentia</i>		
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée			
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>Psalliota flavescens</i>		
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psallote solitaire	<i>A. purpurellus ? , A. dulcidulus</i>		
752	<i>Agaricus porphyron</i> Orton	Agaric porphyre			
756	<i>Agaricus moelleri</i> Wasser	Agaric pintade	<i>A. meleagris, A. praeclaresquamosus</i>		
780	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Monc	Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i>		
790	<i>Parasola conopilus</i> (Fries) Örstadius & E. Larsson	Psathyrelle conique	<i>Psathyrella conopilus</i>		
	Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
854	<i>Amanita amerivirosa</i> Tulloss Kudma & Tullloss	Amanite vireuse robuste			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
855,5	<i>Amanita citrina</i> f. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion			
883	<i>Pluteus griseopus</i> Orton	Plutée à pied gris			
890	<i>Pluteus romellii</i> (Britz.)Saccardo	Plutée de Romell			chapeau brun ridulé (à la loupe) pied jaune
	Ordre : Entolomatales				
910,5	<i>Entoloma rhodopolium</i> f. <i>nidorosum</i> (Fr.) Noord.	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. nidorosum</i>		
920	<i>Entoloma hirtipes</i> (Schumacher:Fr.)Moser	Entolome à pied hérissé	<i>Rhodophyllus mammosus</i>		
921	<i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi)Trimbach	Entolome à pied grêle	<i>E. leptopus, E. mammosum</i>		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
968,5	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hausknecht & Noordeloos	Meunier gris			
	Ordre : Cortinariales				
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radican			longue et robuste rhyzoïde, anneau membraneux translucide
1064	<i>Inocybe godeyi</i> Gillet	Inocybe de Godey	<i>Inocybe trinii</i>		
1096	<i>Cortinarius melanotus</i> Kalchbrenner	Cortinaire à squames brunes			chapeau verdâtre, odeur de persil, chapeau à meche brun foncé sur fond olive
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1169	<i>Cortinarius talus</i> Fr., ss Fr.	Cortinaire à talon	<i>C. melliolens</i>		
1183	<i>Cortinarius elegantissimus</i> Henry	Cortinaire très élégant			15cm de diam. jaune orange et surtout roux au centre, lames verdâtres, pied jaune ochre bulbeux. Chair blanche rose dans le chapeau et le pied, jaune dans le bulbe. KOH rouge vnioux cuticule et chair du bulbe, sans réaction sur le chair ailleurs. Spores en citron 14-16(17)x8-10µm. Double identification effectuée par Etienne: 14-15.5x9µm
1187	<i>Cortinarius xanthophyllus</i> (Cooke)R.Maire	Cortinaire à lames jaunes			chapeau violacé, chair violette sous cuticule, saveur douce, lames jaunâtres
1201	<i>Cortinarius trivialis</i> Lange	Cortinaire trivial			
1204	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Cortinaire élevé	<i>C. lividoochraceus</i>		
1238	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Crépidote aplani			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiote tuberculeuse			
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quél.	Strophaire vert-de-gris			
1268	<i>Stropharia cyanea</i> (Bulliard) Tuomikoski	Strophaire bleu	<i>S. caerulea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard) Fr.	Russule noirissante			
1354	<i>Russula foetens</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Russule fétide			sans réaction à la potasse
1374	<i>Russula mairei</i> Sing.	Russule émétique des hêtres	<i>R. fageticola</i>	hêtre	
1393	<i>Russula sardonica</i> Fr., ss Melzer & Zvára	Russule sardoine	<i>R. drimeia</i>		
1490	<i>Russula pseudointegra</i> Amoult & Goris	Russule coccinée		sous feuillus	
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon		charme	
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>		
1518	<i>Lactarius citriolens</i> Pouzar	Lactaire à odeur de citron	<i>L. cilicioides</i>		
1541	<i>Lactarius necator</i> Pezsoon	Lactaire plombé	<i>L. plumbeus</i>		
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		pin	
1553	<i>Lactarius quieticolor</i> Romagn.	Lactaire orangé gris, Lactaire à couleur de quietus			
1576	<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex Bon	Lactaire fauve orangé			
1579	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant			
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérissant			
	Ordre : Boletales				

1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé		
1612	<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara	Paxille à pied noir	<i>Paxillus atrotom</i>	pin
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonnette voilée		pin
1653,8	<i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Simonini, H. Ladurner & Peintr	Bolet d'Italie	<i>Xerocomus cisalpinus</i>	
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux		
1713	<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> Lannoy & Estadès	Bolet rude gris-brun	<i>L. brunneogrise</i>	bouleau
	Sous-classe : <i>Gasteromycetideae</i>			
1730	<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Scop.) Pers.	Calvatie en coupe	<i>Calvatia excipuliformis</i>	
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle		
1736	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup hérisson		
1748	<i>Mutinus caninus</i> (Hudson : Pers.) Fr.	Satyre du chien		