

Forêt de Marly, Etoile de Montaigu , 16 novembre 2024 , 57 espèces			MEN : 2214B		Commune : Chambourcy
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Arcyria</i> sp.			hêtre	
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
4,1	<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers. : Fr.) Fr.			noisetier	
5	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris	Daldinie concentrique		Frêne	
6,5	<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Xylaïre à long pied			
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
7,4	<i>Diatrype decorticata</i> (Sowerby) Rappaz			hêtre	
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Pézize turquoise			
11,6	<i>Ascocoryne cylichnium</i> (L.R. & C.Tulasne) Korf	Coryne en petite coupe			Spores 17-20 x 4-6 µm
Classe : Pezizomycetes					
22	<i>Helvella macropus</i> (Pers.:Fr.)Karsten	Helvelle à long pied			
28,3	<i>Peziza varia</i> (Hedwig : Fr.) Fr.	Pézize variée		hêtre	
32	<i>Sarcoscypha coccinea</i> (Scopoli:Fr.)Lambotte	Pézize écarlate			
36,1	<i>Scutellinia crinita</i> (Bulliard : Fr.) Lambotte			hêtre	marge à longs poils brun sombre alternant avec des plus courts
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Agaricomycètes \ Ordre Auriculariales					
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille mésentérique		hêtre	
Classe : Agaricomycètes \ Autres ordres					
Agaricomycètes Aphyllophorales					
61,6	<i>Phlebia radiata</i> Fries	Plébie orangée	<i>P. merismoides</i> , <i>P. aur</i>	hêtre	
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute		hêtre	
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schradet:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Xylodon paradoxus</i>		
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois		chêne	
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		hêtre	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore		hêtre	
95,2	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Tramète bossue		hêtre	
95,4	<i>Junghuhnia nitida</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden		<i>Steccherinum nitidum</i> , <i>Poria eupora</i>		
109	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts			
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J.Schröt	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
Agaricomycètes lamellés					
Ordre : Agaricales > à sporée blanche					
141	<i>Panellus stipticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique		hêtre	
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
398	<i>Tricholoma cingulatum</i> (Almfelt:Fr.)Jacobash	Tricholome ceinturé		saule	
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu			
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>		
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
556	<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Mycène olivâtre	<i>M. olivascens</i> , <i>M. oortiana</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			Odeur de radis
612	<i>Phloeomana speirea</i> (Fries) Redhead	Mycène groupée	<i>Mycena speirea</i>	brindille	
629	<i>Hymenopellis radicata</i> (Rehhan) R.H. Petersen	Collybie radicante	<i>Oudemansiella radicata</i>		
Ordre : Agaricales > Agaricaceae, Psathyrellaceae					
769	<i>Coprinellus micaceus</i> (Bulliard) Vilgalys, Hopple & Jacq. John	Coprin micacé	<i>Coprinus micaceus</i>		
780	<i>Coprinopsis picacea</i> (Bulliard) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i>		
790	<i>Parasola conopilus</i> (Fries) Örstadius & E. Larsson	Psathyrelle conique	<i>Psathyrella conopilus</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i>		
Ordre : Agaricales > Amanitaceae					
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
Ordre : Agaricales > Pluteaceae					
866	<i>Pluteus hispidulus</i> var. <i>cephalocystis</i> Schreurs				Les spores 6,5 x 5 µm non discriminantes pour le distinguer de <i>P. exiguus</i> , les cheilocystides utrifformes subcapitées si. Chapeau gris brun hérissé 1 cm, pied 2 cm beige, lames ocre
868	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée brun d'ombre		hêtre	Chapeau hérissé de mèches brunes, lames bordées de brun, pied avec flocons bruns

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
880	<i>Pluteus thomsonii</i> (Berk.et Br.)Dennis	Plutée cendré		hêtre	Chapeau 4 cm brun sombre à rides en relief plus claires, pied 6 cm gris à fibrilles blanches, lames beiges puis roses, spores globuleuses 7,5 x 6 um. cuticule à cellules clavées à piriformes.
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre	La syn. avec <i>luteovirens</i> est récente		Pied jaune clair
	Ordre : Agaricales > Cortinariaceae, Strophariaceae				
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			blanc, odeur spermatque
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée	<i>G. autumnalis</i>		
1268	<i>Stropharia cyanea</i> (Bulliard) Tuomikoski	Strophaire bleu	<i>S. caerulea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1426	<i>Russula grisea</i> Zawadski	Russule grise			
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		sous hêtre	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			Odeur de pelargonium, lait blanc jaunissant sur mouchoir
	Gasteromycètes				
1733	<i>Apioperdon pyriforme</i> (Schaeffer) Vizzini	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i> , <i>Morganella pyriformis</i>		