

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
	DIVISION ASCOMYCOTA				
	Classe : Sordariomycetes				
6	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.:Fr.)Greville	Xylaire polymorphe			
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables			
	Classe : Pezizomycetes				
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
	DIVISION BASIDIOMYCOTA				
	Classe : Phragmobasidiomycètes				
47	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.)Wettstein	Oreille de judas			par sur bureau (habitat habituel), bois non identifié
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
58,5	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees:Fr.	Dacrymyces larmoyant	<i>Dacrymyces deliquescens</i>		globules oranges sur bois mort de feuillus. Spores avec 3 cloisons, 14-15x5µm. Basides bisporiques en diapason.
	Classe : Homobasidiomycetes				
	Sous-classe : Aphylophoromycetideae				
66,5	<i>Stereum insignitum</i> Quélet	Stérée remarquable			
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse	<i>Stereum fasciatum</i>	hêtre	
69,5	<i>Peniophora quercina</i> (Pers.:Fr.)Cooke	Péniophore du chêne			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
	Sous-classe : Agaricomycetideae				
	Ordre : Tricholomatales				
146	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Pleurote du chêne	<i>tephrotrichus</i>		
157	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (DC.) Singer	Pleurote terrestre	<i>geogenius</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
353	<i>Laccaria bicolor</i> (Maire) Orton	Laccaire bicolore			
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé	<i>L. aggregatum</i>		
478	<i>Rugosomyces ionides</i> (Bulliard:Fr.)Bon	Calocybe violet	<i>Calocybe i.</i>		
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris	<i>Collybia conigena</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			odeur de radis - toxique
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			odeur de radis - toxique
	Ordre : Agaricales				
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues	<i>Lepiota acutesquamosa</i>		
675	<i>Lepiota castanea</i> Quélet	Lépiote châtain			
680,5	<i>Lepiota subincarnata</i> Lange, non ss Huijsman		<i>Syn josserandii</i> d'après ER326	chêne	Chapeau ocre-rose tirant sur le rose, pied concolore. Guirlandes sur le tiers inférieur du pied. Odeur fruitée rappelant l'agrumes. Spores elliptiques 6-7x3-4µm. Boucles présentes. Poils piléiques 200-300µm. microscopie conforme au DM Hors Serie de Bon
731	<i>Agaricus romagnesii</i> Wasser	Agaric radicaire	<i>A. radicatus</i>		
756	<i>Agaricus moelleri</i> Wasser	Agaric pintade	<i>A. meleagris, praeclaresquamosus</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu		pelouse	pelouses devant la forêt
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		

	Ordre : Amanitales				
844	<i>Amanita echinocephala</i> (Vittadini)Quélet	Amanite épineuse			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
881	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée nain			
901	<i>Volvariella gloiocephala</i> (DeCand.:Fr.)Boekhout & Enderle	Volvaire visqueuse	<i>speciosa</i>	pelouse	pelouses devant la forêt
	Ordre : Entolomatales				
910,5	<i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.)Quélet	Entolome à odeur nitreuse	<i>E. rhodopolium f. nidorosum</i>		
920	<i>Entoloma hirtipes</i> (Schumacher:Fr.)Moser	Entolome à pied hérissé	<i>Rhodophyllus mammosus</i>		
	Ordre : Cortinariales				
1028	<i>Inocybe piriadora</i> (Pers. : Fr.) Kummer 1871	Inocybe à odeur de poire	<i>fraudans</i>		Chapeau fibrilleux jaune miel, mamelonné, sans squamules. Pied 8 cm x 1 cm, blanc sous les lames et ocre plus bas, rougissant en séchant. Lames ocre, serrées. Forte odeur aromatique (benjoin, alcool de poire (?)). Chair légèrement rossissante à la coupe, rouge plus profond à l'endroit mangé par les limaces. Spores 10-11x6-7µm, en forme de pépin de citron, avec un apicule, et l'autre extrémité resserrée (somett 'étiré' d'après la terminologie de Bon), et intérieur granuleux (mais pas la surface). Cystides métuloïdes avec crital, sans réaction à KOH, légèrement jaunissante à NH3, paroi épaisse de 2µm. Boucles + (hyphes de la cuticule). D'autre cystides en massue à tete large au mileu des cystides métuloïdes.
1037,5	<i>Inocybe cincinnata</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Inocybe à fibrilles bouclées	<i>I. phaecomis</i>		
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées			
1114	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée			
1234	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Tubaire voilée			
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1268	<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Strophaire bleu	<i>S. cyanea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		bouleau	
1526	<i>Lactarius mairei</i> Malençon, non ss Pacioni,Cetto	Lactaire à poil ras, Lactaire de Maire	<i>L. aurantioochraceus;</i> <i>L. aurantiacoochraceus</i>		
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire à odeur de punaise			
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux			
1733	<i>Lycoperdon pyriforme</i> Schaeffer (1774)	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Morganella pyriformis,</i> <i>Apioperdon p.</i>		