

No	Taxon	Nom français	Synonyme	Biologie
	SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA			
	Sous-classe Pyrenomycetideae			
3	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode:Fr.)Fr.	Nectrie rouge cinabre		SL
4.1	<i>Hypoxylon multiforme</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Hypoxylon multiforme		SL
6	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.:Fr.)Greville	Xylaire polymorphe		SL
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois		SL
7.4	<i>Diatrype stigma</i> (Hoffmann:Fr.) Fr.	Diatrype en croûte		SL
	Sous-classe Loculoascomycetideae			
7.8	<i>Leptosphaeria acuta</i> (Hoffmann:Fr.)Karsten	Leptosphère pointu		SL
	Sous-classe Pezizomycetideae			
8	<i>Geoglossum cookeanum</i> Nannfeldt	Géoglosse de Cooke		S
8,05	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables		PnFo
8.1	<i>Calloria neglecta</i> (Libert)Hein	Callorine négligée	<i>Callorina fusaroides</i>	SL
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue		S
23	<i>Helvella acetabulum</i> (L.:Fr.)Quélet	Helvelle en gobelet		S
24	<i>Helvella leucomelaena</i> (Pers.)Nannfeldt	Helvelle blanc et noir		S
28	<i>Peziza vesiculosa</i> Bulliard:Fr.	Pézize vésiculeuse		S
	SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA			
	Classe : Phragmobasidiomycètes			
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique		PnFu
51	<i>Exidia glandulosa</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Exidie glanduleuse		SL
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		SL
	Classe : Homobasidiomycètes			
	Sous-classe : Aphyllophoromycetideae			
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute		SL
69	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.:Fr.)Pouzar	Stérée pourpre		SL
74	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	Hydne cure-oreilles		SL
79.5	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Schrader:Fr.)Léveillé	Hymenochaete rouillé		SL
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de bœuf		PnL/SL
82.5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré		PnL
86	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers.:Fr.) Karsten	Polypore rutilant		SL
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		PnL
90.5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		PnL
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore		SL
96	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvardeen	Tramète lilas		SL
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée		SL
106.5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Polypore élégant		SL
107.5	<i>Polyporus brumalis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore hivernal		SL
111.2	<i>Cantharellus subpruinosis</i> Eyssartier & Buyck	Giroлле, chanterelle		EcM
115.5	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen:Fr.)Fr.	Clavaire crépue		PnL/SL
117.1	<i>Clavulinopsis helvola</i> (Pers. : Fr.) Corner	Clavaire jaunâtre	<i>Ramaropsis helvola</i>	S
118	<i>Macrotyphula filiformis</i> (Bull. : Fr.) Paechnatz	Clavaire filiforme	<i>juncea</i>	S
	Sous-classe : Agaricomycetideae			
	Ordre : Tricholomatales			
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique		SL
165	<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.:Fr.)Redhead	Leptoglosse des mousses	<i>Leptoglossum muscigenum</i>	PnMo
174	<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wülf.:Fr.)Kovalenko	Hygrophore blanc	<i>C. niveus</i>	S/EnM
189	<i>Hygrocybe conica</i> (Scop.:Fr.)Kummer	Hygrophore conique		S/EnM
191	<i>Hygrocybe pseudoconica</i> Lange	Hygrophore noircissant	<i>H. nigrescens</i>	S/EnM
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus		EcM
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir		S
282	<i>Clitocybe sinopica</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Clitocybe rouge de Sinope		S
287	<i>Lepista inversa</i> (Scop.)Patouillard	Clitocybe inversé		S
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux		S
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé		S
299	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler		S
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe bicolor	<i>C. bicolor</i>	S
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel		SL/PnL
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse		SL
326	<i>Phaeotellus rickenii</i> (Hora) Bon	Omphale de Ricken		Mo
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mo
328	<i>Rickenella swartzii</i> (Fr.:Fr.)Kuyper	Omphale de Swartz		Mo
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste		EcM
355	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué		EcM
390	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé		EcM
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun		EcM
420	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeffer:Fr.)Singer	Tricholome rutilant		SL
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu		S
425	<i>Lepista sordida</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiste sordide		S
446	<i>Melanoleuca subalpina</i> (Britzelmayr) Bresinsky & Stangl	Melanoleuca blanchâtre	<i>M. evenosa</i>	S
447.5	<i>Melanoleuca arcuata</i> (Fr.) Singer	Melanoleuca vernal	<i>M. cognata</i> var. <i>typica</i> (BK3-298)	S
473	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome agrégé		S/SL
482	<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome de la St Georges (23 avril), Mousseron		S
494	<i>Marasmius androsaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Marasme en rosace		S
497.5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard		SL

No	Taxon	Nom français	Synonyme	Biologie
504	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.)Fr.	Faux mousseron, Marasme des Oréades		S
513	<i>Collybia cirrhata</i> (Pers.) Kummer	Collybie filiforme		S/SL
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée		S
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau		PnL
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée		S
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes		S
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>C. erythropus, marasmioides</i>	S/SL
535	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.:Fr.)Singer	Collybie queue de souris		SL
539	<i>Hemimycena mairei</i> (Gilbert)Singer	Mycène de Maire		S
554	<i>Mycena flavescens</i> Velenovsky	Mycène jaunâtre		S
555	<i>Mycena metata</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Mycène conique		S
564	<i>Mycena olivaceomarginata</i> (Masse) Masee	Mycène à arête olive		S
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque		SL
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée		SL
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc		S
597	<i>Mycena haematopus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Mycène à lait rouge		SL
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure		S
601.3	<i>Mycena pura</i> fo. <i>alba</i> (Gill.)Kühn.	Mycène pure forme blanche		S
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose		S
606	<i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quélet	Mycène jaune pâle		S
623	<i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers.:Fr.)Singer	Collybie tenace		SL
Ordre : Agaricales				
666	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Lépiote à demie nue		S
670	<i>Lepiota laevigata</i> (Lange) Lange	Lépiote lisse		S
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier		S
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée		S
677	<i>Lepiota grangei</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote à squames olivacées		S
709.5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée		S
713	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée		S
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée		S
719	<i>Agaricus campestris</i> L.:Fr.	Rosé des prés		S
725	<i>Agaricus bitorquis</i> (Quélet)Saccardo	Psallote des trottoirs		S
739	<i>Agaricus silvaticus</i> Schaeffer	Agaric des forêts		S
747	<i>Agaricus silvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois		S
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Genevier	Psallote jaunissante		S
756	<i>Agaricus praeclaresquamosus</i> Freeman	Agaric pintade	<i>A. meleagris</i>	S
759.5	<i>Coprinus kuehneri</i> Ulijé & Bas	Coprin de Kühner	<i>Parasola k.</i>	S
766	<i>Coprinus domesticus</i> (Bolt.:Fr.)Gray	Coprin domestique		SL
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé		SL
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu		S
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>	S
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie		S
786.5	<i>Psathyrella ochracea</i> (Romagnesi) Kits v.Waveren	Psathyrelle ocracée		S
787.2	<i>Psathyrella prona</i> fo. <i>cana</i> Kits v.Waveren	Psathyrelle à pied brun		S
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle		SL
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile		SL
Ordre : Amanitales				
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		EcM
838	<i>Amanita junquillea</i> Quélet	Amanite jonquille	<i>A. gemmata</i>	EcM
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère		EcM
841.5	<i>Amanita excelsa</i> (Fr. : Fr.) Bertillon	Amanite élevée		EcM
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte		EcM
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde		EcM
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine		EcM
Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf		SL
858.5	<i>Pluteus pouzarianus</i> Singer			SL
Ordre : Entolomatales				
921	<i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi)Trimbach	Entolome à chapeau obtus		S
927	<i>Entoloma sericeum</i> (Bull.->)Quélet	Entolome soyeux		S
944.5	<i>Entoloma chalybaeum</i> var. <i>lazulinum</i> (Fr.) Noordeloos	Entolome à chair bleue		S
959	<i>Entoloma sericellum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Entolome blanc soyeux		S
964	<i>Entoloma undatum</i> (Fr.->Gillet)Moser	Entolome ondoyeux		S
Ordre : Cortinariales				
987	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.)Quélet	Hébélome à centre foncé		EcM
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé		EcM
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant		EcM
1011	<i>Inocybe dulcamara</i> (Alb.et Schweiniz)Kummer	Inocybe doux amer		EcM
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigé	<i>I. rimosa</i>	EcM
1055.5	<i>Inocybe gausapata</i> Kühner	Inocybe pelucheux		EcM
1068.5	<i>Inocybe subbrunea</i> Kühner	Inocybe à chapeau lisse	<i>I. leioccephala</i> Stuntz	EcM
1086	<i>Inocybe mixtilis</i> (Britzelmayer) Saccardo	Inocybe à bulbe marginé		EcM
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		SL
1209	<i>Gymnopilus penetrans</i> var. <i>hybridus</i> (Bull.) Roux	Gymnopile hybride	<i>G. hybridus</i> (Sowerby : Fr) Maire	SL
1219	<i>Galerina graminea</i> (Velenovský) Kühner	Galère des graminées	<i>G. laevis</i>	S

No	Taxon	Nom français	Synonyme	Biologie
1236	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagnesi ex Bon	Tubaire hivernale		SL
1267	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.:Fr.)Quélet	Strophaire vert-de-gris		S
1272	<i>Stropharia coronilla</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Strophaire coronille		S
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes		SL
1299	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.:Fr.)Fayod	Agrocybe précoce		S/SL
1304	<i>Agrocybe pediades</i> (Fr.:Fr.)Fayod	Agrocybe des pelouses		S
Ordre : Russulales				
1360	<i>Russula pectinatoides</i> Peck	Russule fausse pectinée		EcM
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>	EcM
1376	<i>Russula fragilis</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Russule fragile		EcM
1393	<i>Russula drimeia</i> Cooke	Russule sardeine	<i>R. sardonica</i>	EcM
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière		EcM
1412	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule à lames fourchues (R. verte)		EcM
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule vieux-rose		EcM
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr. ss Gillet	Russule grise		EcM
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante		EcM
1476	<i>Russula velenovskýi</i> Melzer & Zvára	Russule de Velenovsky		EcM
1523	<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Lactaire pubescent		EcM
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		EcM
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur		EcM
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré		EcM
Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		S
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé		EcM
1632	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille	Bolet poivré		EcM
1640	<i>Suillus luteus</i> (L.:Fr.)Roussel	Nonette voilée		EcM
1643	<i>Suillus granulatus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet granulé		EcM
1644	<i>Suillus collinitus</i> (Fr.)Kuntze	Bolet à mycélium rose		EcM
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers		EcM
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune		EcM
#####	<i>Xerocomus communis</i> (Bulliard)Bon	Bolet commun		EcM
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai		EcM
1668	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Bolet amer, Chicotin		EcM
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux		EcM
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été		EcM
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge		EcM
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes		EcM
1712	<i>Leccinum variicolor</i> Watling	Bolet ramoneur	<i>L. oxydabile</i>	EcM
Sous-classe : Gasteromycetidae				
1717	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.:Pers.)Morgan	Astrée hygrométrique		EcM
1718	<i>Geastrum triplex</i> Junghuhn	Géastre à trois enveloppes		S
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun		EcM
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.)Pers.	Scléroderme verruqueux		EcM
1733	<i>Morganella pyriformis</i> (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. K	Vesse-de-loup en forme de poire	<i>Lycoperdon pyriforme</i>	SL
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée		S
1736	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle		S

Statut biologique

EcM	Ectomycorhizique
EnM	Endomycorhizique
Fu	Fongicole
Pb	Parasite biotrope (hôte vivant)
Pn	Parasite nécrotrophe (pouvant poursuivre son développement après la mort de l'hôte)
Mo	Associé aux mousses
SC	Saprotrophe coprophile
SFo	Saprotrophe foliicole
SHe	Saprotrophe herbicole
SL	Saprotrophe lignicole
S	Saprotrophe humicole ou autre

No	Taxon	Nom français	Synonyme	Biologie
----	-------	--------------	----------	----------

--	--	--	--	--