

# Compte rendu de la sortie du samedi 04 juin 2022.

Lieu : Forêt de Carnelle (95) entre Presles et Saint Martin du Tertre – Bord de l'étang (lac bleu et Petit étang) et zone forestière.


Groupe : 5 personnes

La météo très incertaine au départ, nous a finalement donné quelques belles heures ensoleillées avant les orages de l'après-midi.

La forêt de Carnelle est un massif forestier de 975 hectares dont le nom vient du mot celtique « carn » qui signifie « la pierre ». Les essences principales sont le chêne (sessile et pédonculé), le hêtre et le châtaignier. Elle s'étend sur une butte de 210 mètres d'altitude qui domine tout le département. La forêt de Carnelle fut comme celles de l'Isle-Adam ou de Montmorency largement exploitée pour ses ressources naturelles. L'exploitation du gypse commence dès 1864, celle de la meulière en 1901. On en extrayait également les marnes ou le sable.

Cette forêt abrite un monument mégalithique connu pour être le plus important monument préhistorique d'Île-de-France : La Pierre Turquoise.

Le Lac bleu et le Petit étang sont des étangs artificiels, d'une surface respective de 2 ha et 1,3 ha et d'une profondeur d'environ 20 mètres, qui ont été aménagés dans d'anciennes carrières de marnes ce qui donnent ici une coloration bleue (plutôt gris-vert lors de notre sortie).




Crédits photos : Isabelle ©IG, Chantal ©Chantal B, Jean-Marc ©JMA




De longs moments d'observation au bord d'une mare.....



....qui ont permis d'assister à la « naissance » d'un imago de libellule.



Coloration en devenir





**Ordre Odonata**  
Famille Coenagrionidae

Nymphe au corps de feu (*Pyrrhosoma nymphula* Sulzer)



Agrion jouvencelle (*Coenagrion puella* L.)  
Accouplement en «cœur copulatoire»



Agrion à larges pattes (*Platycnemis pennipes* Pallas)  
Accouplement en «cœur copulatoire»



Famille *Libellulidae*

Libellule fauve (*Libellula fulva* O.F. Müller)  
mâle



Libellule déprimée (*Libellula depressa* Linnaeus)  
mâle



Libellule à quatre taches (*Libellula quadrimaculata* Linnaeus), femelle en vol d'approche





Libellule à quatre taches  
(*Libellula quadrimaculata* Linnaeus)  
femelle





Orthétrum réticulé (*Orthetrum cancellatum* Linnaeus)  
mâle



femelle





**Famille *Cerambycidae***

Sous-famille *Cerambycinae*

Clyte blier, clyte gupe, (*Clytus arietis* Linnaeus)

Adulte diurne floricole ou courant au soleil sur les troncs d'arbres morts. Larve saproxylophage, sur feuillus.



**Famille *Chrysomelidae***


Sous-famille *Cassidinae*

Casside tache de rouille (*Cassida rubiginosa* O.F.Mller).



Sous-famille *Galerucinae*

Galruque bleue, Chrysomle de l'Aulne (*Agelastica alni* Linnaeus)



Altise (*Altica* sp.)

A remarquer les pattes saltatoires (cuisses renfles)





**Famille *Curculionidae***

Sous-famille *Entiminae*

Charençon vert-soyeux (*Polydrusus formosus* Mayer)



*Polydrusus pterygomalis* Boheman, cette espèce est caractérisée par son revêtement de squamules vertes très brillantes et par les deux bosses en arrière des yeux. Longueur 4 à 5 mm. L'adulte se trouve sur de nombreux feuillus Chêne, Noisetier, Charme, Bouleau, Hêtre, ..



**Famille *Melyridae***

Sous-famille *Malachiinae*

Malachie à deux points *Malachius bipustulatus* Linnaeus





## Famille *Coccinellidae*

Grande coccinelle orange (*Halysia sedecimguttata* Linnaeus)

La larve et l'adulte sont mycophages.  
Les adultes se rencontrent sur les arbres et les buissons.

A noter le thorax élargi en avant qui recouvre la tête.



Coccinelle à quatorze points  
(*Calvia quatuordecimguttata* Linnaeus)



Larve coccinelle (*Adalia* sp.)



## Famille *Cantharidae*

Le téléphore trompeur (*Cantharis decipiens* Baudi di Selve)





## Ordre *Lepidoptera*

Le Paon du jour, (*Aglais io Linnaeus*)  
Chenille sur *Urtica dioica*

Adulte (Photo d'illustration non prise sur site)



## Ordre *Hemiptera*

### Famille *Acanthosomidae*

Punaise de l'aubépine, Punaise ensanglantée (*Acanthosoma haemorrhoidale Linnaeus*)

