

Compte rendu de la sortie du samedi 21 mai 2022.

Lieu : Forêt de Rambouillet, Étang de Pourras – sentier en sous-bois puis végétation proche de bord d'étang et enfin allée forestière.

Météo : très favorable, journée très ensoleillée qui suivait une journée pluvio-orageuse

Groupe : 15 personnes



Chasse à vue et utilisation du matériel de collecte, filet fauchoir et nappe japonaise et relevé de pièges type « Barber ».

Accueil enthousiaste de certains insectes



Les photographes dans leurs œuvres



Crédits photos : Isabelle ©IG, Solen ©SB, Chantal ©Chantal B, Benoît ©BF, Jean-Marc ©JMA

Ordre Coleoptera
Famille Carabidae,
Sous-famille *Cicindelidae*



Cicindèle champêtre (*Cicindela campestris Linnaeus*)

Sous-famille *Carabinae*

Carabe à reflets cuivrés (*Carabus (Chrysocarabus) auronitens Fabricius*), essentiellement forestier en plaine, espèce nocturne carnivore présente dans de nombreuses forêts d'Ile de France.

Espèce qui peut être très variable de coloration, notamment dans les forêts Normandes (Coll JMA).



Famille Geotrupidae,

Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun (*Anoplotrupes stercorosus Scriba*)
Adulte coprophage. Souvent dans les crottins et dans les champignons à l'automne. Diurne.



Famille *Elateridae*

Sous famille *Elaterinae*



Ampedus sp.,
Plusieurs espèces
très voisines en Ile
de France.

Sous-famille : *Hypnoidinae*

Le taupin pourpre (*Anostirus purpureus* Poda)



Taupin cyclone (*Prosternon tessellatum* Linnaeus). La larve se développe dans les souches cariées d'essences variées.



Famille *Tenebrionidae*

Sous-famille *Lagriinae*

Lagrie (*Lagria sp.*, deux espèces très proches *hirta* et *atripes*). La larve se nourrit de substances végétales en décomposition



Famille *Cerambycidae*

Sous-famille *Lepturinae*

Lepture trappue (*Pachytodes cerambyciformis* Schrank). Adulte floricole et diurne. Larve saproxylique, se développant dans les racines mortes d'arbres feuillus et parfois de résineux.



Lepture noire (*Stenurella nigra* Linnaeus). Adulte diurne et floricole. Larve saproxylophage dans bois décomposé de feuillus.



Lepture tachetée (*Rutpela maculata* Poda). Adulte diurne et floricole. Larve saproxylophage dans bois décomposé de feuillus.



Lepture gouttes de miel (*Anoplodera sexguttata* Fabricius). Adulte diurne et floricole. Larve saproxylophage dans bois décomposé de feuillus



Rhagie délatrice, Rhagie sycophante (*Rhagium sycophanta* Schrank). Adulte sur tronc de chêne.
Larve saproxylophage dans les troncs de chênes



Famille *Cerambycidae*

Sous-famille *Cerambycinae*

Clyte horrible, clyte arqué (*Plagionotus arcuatus* Linnaeus). Adulte diurne courant au soleil sur les troncs d'arbres morts. Larve saproxylophage, creusant des galeries dans les troncs de chênes, châtaigniers.



Clyte frelon (*Plagionotus detritus* Linnaeus). Adulte diurne courant au soleil sur les troncs d'arbres morts. Larve saproxylophage, creusant des galeries dans les troncs de chênes.



Clyte fâché (*Clytus tropicus* Panzer). Adulte se nourrissant de sève dans la canopée. Larve saproxylophage, creusant des galeries dans les troncs de chênes.



Clyte bélière, clyte guêpe, (*Clytus arietis* Linnaeus)
Adulte diurne floricole ou courant au soleil sur les troncs d'arbres morts. Larve saproxylophage, sur feuillus.



Le petit capricorne (*Cerambyx scopolii* Fuessly). Adulte floricole, larves dans le bois de divers feuillus



Le calleux chauffagiste (*Phymatodes testaceus* Linnaeus). Adulte crépusculaire et nocturne. Larve saproxylophage consomme du bois mort.



Famille *Chrysomelidae*

Sous-famille *Donaciinae*

Donacie des roseaux (*Donacia clavipes Fabricius*) Espèce phytophage dont les larves consomment les Phragmites.



Sous-famille *Cassidinae*

Casside verte (*Cassida viridis Linnaeus*).



Sous-famille *Criocerinae*

Oulema melanopus Linnaeus



Oulema gallaeciana L.F.J.D. Heyden



Famille Attelabidae

Sous-famille Rhynchitinae

Cigarier du bouleau (*Deporaus betulae* Linnaeus),



Famille Curculionidae

Sous-famille Entiminae

Charençon vert-soyeux (*Polydrusus formosus* Mayer)



Polydrusus marginatus Stephens



Sous-famille Curculioninae

Curculio venosus Gravenhorst



Famille Cleridae

Sous-famille *Clerinae*

Grand clairon, clairon mutile (*Clerus mutillarius Fabricius*). Espèce prédatrice qui se trouve sur les branches mortes de diverses essences. L'adulte et la larve chassent des scolytes sur les troncs de chênes abattus.



Famille Melyridae

Sous-famille *Malachiinae*

Malachie à deux points

Malachius bipustulatus Linnaeus



Famille Pyrochroidae

Sous-famille *Pyrochroinae*

Cardinal, Pyrochore écarlate

Pyrochroa coccinea Linnaeus



Famille Coccinellidae

Harmonia axyridis Pallas

Coccinelle asiatique ou Coccinelle arlequin



Ordre Odonata

Famille *Coenagrionidae*

Agrion élégant (*Ischnura elegans* Vander Linden)

Accouplement



femelle immature



Famille *Libellulidae*

Libellule fauve (*Libellula fulva* O.F. Müller)
mâle mature



Ordre *Lepidoptera*

Famille *Pieridae*

Sous-famille *Coliadinae*

Le Citron, (*Gonepteryx rhamni Linnaeus*)

Chenille sur *Rhamnus*

(Photo d'illustration non prise sur site)



Famille *Nymphalidae*

Sous-famille *Limenitidinae*

Le petit Sylvain, (*Limenitis camilla Linnaeus*)

Chenille sur *Lonicera*

(Photo d'illustration non prise sur site)



Sous-famille *Nymphalinae*

La belle-Dame, (*Vanessa cardui Linnaeus*)

Chenille sur chardons et plusieurs autres espèces végétales



Le Paon du jour, (*Aglais io Linnaeus*)

Chenille sur *Urtica dioica*

(Photo d'illustration non prise sur site)



Sous-famille *Satyrinae*

Le Tircis, (*Pararge aegeria Linnaeus*)

Chenille sur *Brachypodium*, *Cynodon*, etc..



Famille *Geometridae*

Sous-famille *Sterrhinae*

L'Ephyre ponctuée

(*Cyclophora punctaria* Linnaeus)



Sous-famille *Ennominae*

Le Céladon

(*Campaea margaritaria* Linnaeus)



La Panthère

(*Pseudopanthera macularia* Linnaeus)



Famille *Oecophoridae*

(*Alabonia* sp.)



Ordre *Diptera*
Famille *Coenomyidae*
(*Coenomyia ferruginea* Scopoli)



Ordre *Mecoptera*
Famille *Panorpidae*
Panorpe femelle
(*Panorpa vulgaris* Imhoff & Labram)



Ordre *Hemiptera*
Famille *Cercopidae*
Cercope
(*Cercopis vulnerata* Rossi)



Ordre *Hemiptera*
Famille *Pentatomidae*
(*Dyroderes umbraculatus* Fabricius)

